

Cefuroxima intracameral

27-8-2013

Estimados compañeros.

Nos gustaría conocer si preparáis colirio de clorhexidina al 0,02% congelado. Por otro lado, estamos interesados en saber si en alguno de vuestros hospitales está incluido Prokam 50 mg (Cefuroxima intracameral).

Muchas gracias, un saludo.

Mensaje enviado por: Servicio de Farmacia. C.H.U. A Coruña.

Respuesta

En cuanto al uso de Prokam[®], el problema no es la indicación de la cefuroxima (podemos y debemos trabajar con el RD 1015/2009) el problema es el riesgo inherente a una preparación intravitrea desde un vial liofilizado. En la matriz de valoración de riesgo en la preparación de medicamentos en la que están trabajando compañeros de la SEFH y el Ministerio (nuestra compañera la Dra Martín de Rosales probablemente lo presente en el Congreso de Málaga) indica claramente que las preparaciones intraviteas son de alto riesgo y deben ser preparadas en ambientes controlados (campanas de flujo laminar como mínimo).

Aún sin publicar esta matriz, es de pura lógica pensar que hay más riesgo para el paciente en preparar intraviteas desde un vial (por mucho que tenga la indicación) fuera de una sala blanca - con sus correspondientes controles, tanto ambientales, como de personal, como en las propias preparaciones, antes de liberar un lote - que si se prepara con todas estas medidas de control - aunque se parta de una marca comercial sin la indicación adecuada.

Respuesta enviada por : Grupo Trabajo Farmacotecnia SEFH