

Clorpromazina inyección retrobulbar

14-11-2011

Hola:

Nos han solicitado la preparación de clorpromazina para la administración retrobulbar.

Me gustaría saber si alguien dispone de algún PNT de elaboración o algún protocolo de utilización.

Muchas gracias.

Mensaje enviado por : Servicio de Farmacia. Hospital General de Almansa

Respuesta

Adjunto algunos artículos que aportan información. La dosis administrada es de 25 mg de clorpromazina.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7430547>

<http://www.intramed.net/contenidoover.asp?contenidoID=51334&pagina=3>

<http://www.misionmilagro.sld.cu/vol3no2/inv3205.php>

<http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01404364>

<http://www.ophtmanagement.com/article.aspx?article=85608>

<http://archophth.ama-assn.org/cgi/content/summary/111/10/1322>

Si estas interesado disponemos del artículo:

Estafanous MF , Kaiser PK , Baerveldt G .Retrobulbar chlorpromazine in blind and seeing painful eyes. Retina.2000 ; 20(5):555-8

Un saludo

[Consulta revisión: 27-3-2014]

Respuesta enviada por : Grupo Trabajo Farmacotecnia SEFH