

## Triamcinolona 1% uretral

22 -3- 2013

Los urólogos de nuestro hospital nos han solicitado preparación de triamcinolona 1% en ungüento, gel o algo parecido para administración uretral, (estenosis uretral y tejido cicatricial). Si en vuestros hospitales habéis preparado o sabéis como se prepara y conocéis estabilidad, nos sería de gran utilidad.

Los urólogos nos pasaron un artículo donde indican que se emplea, pero no viene como lo realizan. Gracias

*Jalil Hosseini, Ali Kaviani, Ali Reza Golshan. Clean Intermittent Catheterization With Triamcinolone Ointment Following Internal Urethrotomy. Urology Journal Vol 5 No 4 Autumn 2008*

Mensaje enviado por: Hospital Son Llatzer (Palma de Mallorca).

## Respuesta

En referencia a la posible formulación de triamcinolona 1% para administración uretral y sin entrar en valoraciones sobre la indicación y/o eficacia mencionada en el artículo

*“Jalil Hosseini, Ali Kaviani, Ali Reza Golshan. Clean Intermittent Catheterization With Triamcinolone Ointment Following Internal Urethrotomy. Urology Journal Vol 5 No 4 Autumn 2008”*

- Por vía tópica las formulaciones de triamcinolona acetónido son relativamente frecuentes en distintas bases para tratamiento de patologías de la mucosa oral y otras lesiones de la piel. En la página de compoundingmatters de Fagron disponen de varias formulaciones que suministran información sobre los vehículos utilizados: <http://www.compoundingmatters.com/en/formulas#T>

- Por vía tópica las concentraciones suelen estar comprendidas entre 0,5% y 0,05%. Como ungüento se puede elaborar con vaselina filante , humectando previamente el polvo con vaselina líquida para su posterior dilución.

[Consulta revisión: 21-3-2014]

Respuesta enviada por : Grupo Trabajo Farmacotecnia SEFH