

## ACIDO ACETICO 2% SOLUCIÓN TOPICA

### FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

### CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

### COMPOSICIÓN:

ACÉTICO GLACIAL, ÁCIDO	2ml
AGUA PURIFICADA c.s.p.	100ml

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Uso cutáneo

### INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

#### INDICACIONES

- La dilución al 5% es bactericida (pH menor de 3). A concentraciones menores (pH 3-6) la dilución es bacteriostática.
- Soluciones del 1-5% se utilizan como antibacterianas frente a *Pseudomonas* spp, *Haemophilus* spp, algunos hongos (*Candida* spp) y protozoos (*Tricomonas* spp).
- Al 2% se ha utilizado también para lavar la vulva antes de practicar el test de Collins, aunque el test tiene baja especificidad y sensibilidad por lo que ha perdido relevancia diagnóstica.

#### POSOLOGÍA:

Soluciones tópicas como antibacterianas se suelen utilizar en forma de fomentos, aplicando sobre el área a tratar durante 15-30 min varias veces al día, según prescripción médica. Algunas indicaciones requieren la aplicación del producto por personal especializado.

### NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Algunas indicaciones requieren la aplicación del producto por personal especializado.

### SOBREDOSIS:

Si usted se ha aplicado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

### EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### USO EN NIÑO:

No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños.

### EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

**OTRAS:**

Recomendable protección ocular para su manipulación. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

**PRECAUCIONES:**

Se debe manejar con cuidado porque es irritante.

**INTERACCIONES:**

Este medicamento puede interactuar con otros. Consulte a su médico ó farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento, sobre todo los adquiridos sin receta o productos de herbolario.

**REACCIONES ADVERSAS:**

La aplicación local o tópica puede producir escozor o prurito.

**CONSERVACION:**

Conservar a temperatura inferior a 25°C, protegido de la luz y la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

**PLAZO DE VALIDEZ:**

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 3 meses desde su elaboración.

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:**

09/09/2017