

ALUMINIO HIDRÓXIDO 233 MG CÁPSULAS DURAS

FORMA FARMACÉUTICA:

Cápsulas gelatina

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 uds

COMPOSICIÓN:

ALUMINIO, HIDROXIDO DE	23.3g
CÁPSULAS N° 00	100uds

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES:

El hidróxido de aluminio (ageldrato) se utiliza como antiácido. En el tubo digestivo el hidróxido de aluminio se une a fosfato para formar complejos insolubles y reduce la absorción de fosfato. Por consiguiente se utiliza también para tratar la hiperfosfatemia en pacientes con insuficiencia renal crónica.

POSOLOGÍA:

Antiácido: 640mg 5-6 veces al día después de las comidas y antes de acostarse (máximo 3.840mg al día).

Hipofosfatemiante: 300-600mg 3 veces al día con las comidas. Debería reservarse para niveles de fosfato > 7mg/dl y a una duración de 4 semanas.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Vía oral. Tomar con un vaso de agua (no tomar con leche).

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños.

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar

maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

Por norma general, se deberá espaciar entre 2 y 3 horas la toma de aluminio hidróxido (4 horas en el caso de las fluorquinolonas) para evitar interacciones no deseadas con otros medicamentos.

Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al principio activo.

Porfiria, insuficiencia renal grave, hipofosfatemia, hemorragia gastrointestinal o rectal, obstrucción intestinal o enfermedad de alzheimer.

PRECAUCIONES:

Pacientes con insuficiencia renal o hepática, pacientes con estreñimiento, pacientes en situación de deshidratación o restricción de líquidos.

Se ha descrito toxicidad de aluminio en pacientes sometidos a diálisis y la posible asociación entre el consumo de aluminio y la enfermedad de Alzheimer.

INTERACCIONES:

Los preparados de aluminio utilizados como antiácidos interaccionan con otros fármacos, tanto por alteraciones del pH y el vaciado gástrico como por adsorción directa y formación de complejos que no se absorben.

REACCIONES ADVERSAS:

Estreñimiento, hipofosfatemia con aumento de resorción ósea e hipercalciuria, con riesgo de osteomalacia.

CONSERVACION:

Conservar a temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz y la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 6 meses desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

26/03/2017