

ÁCIDO BÓRICO 600 MG CÁPSULAS DURAS VAGINALES

FORMA FARMACÉUTICA:

Cápsulas gelatina

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 uds

COMPOSICIÓN:

ÁCIDO BÓRICO	60g
CÁPSULAS N° 00	100uds

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía vaginal

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES:

- Tratamiento de la candidiasis vaginal recurrente

POSOLOGÍA:

- 1 cápsula vaginal de 600mg cada 24h durante 14 días.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Insertar una cápsula profundamente en la vagina antes de acostarse. Es recomendable iniciar el tratamiento coincidiendo con el fin de la menstruación.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben

mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

Personas con sensibilidad conocida al ácido bórico y en caso de lesiones ulceradas.

PRECAUCIONES:

No se debe emplear durante largos periodos de tiempo.

Esta sustancia es tóxica por vía oral.

INTERACCIONES:

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento incluso si no necesita receta médica.

REACCIONES ADVERSAS:

Esta sustancia es tóxica por vía oral.

La intoxicación por las sales de ácido bórico puede aparecer como consecuencia de una absorción excesiva, bien por ingestión accidental o a través de áreas cutáneas desnudas o quemadas. Su empleo de forma continuada podría ocasionar toxicidad acumulativa tras su absorción, debido a que presenta una absorción muy lenta.

La intoxicación se manifiesta por vómitos, diarrea, dolor abdominal y erupciones eritematosas en la piel y mucosas, seguida de descamación y estimulación o depresión del SNC. Puede originar convulsiones o fiebre alta. También puede producir fallo renal y raramente ictericia y funcionamiento hepático anormal.

CONSERVACION:

Conservar a temperatura inferior a 30 °C, protegido de la luz y la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 6 meses desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

14/03/2017