

ACEITE SALICILADO CON ALCOHOL (PO)

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía tópica

INDICACIONES Y POSOLOGÍA:

El ácido salicílico actúa contra bacterias y hongos, además, según su concentración, ayuda a endurecer la piel (queratoplástico) o bien a eliminar las durezas y callosidades (queratolítico). Este preparado se utiliza en la dermatitis seborreica y la psoriasis del cuero cabelludo.

Se aplica por la noche en la zona a tratar y se retira a la mañana siguiente usando un champú neutro para la piel.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Respete estrictamente las dosis y pauta de administración recomendadas. Aplíquelo sobre la superficie afectada, limpia y seca, en cantidad suficiente para cubrirla; se reparte con la punta de los dedos, sin frotar, procurando que no se extienda a las zonas sanas. Lave inmediatamente las manos tras la aplicación.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información toxicológica, tño: 915620420.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

USO EN NIÑOS:

No debe utilizarse en niños menores de 2 años y con precaución en niños mayores de 2 años.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

OTRAS ADVERTENCIAS:

No utilice vendajes oclusivos a menos que se lo indique el médico.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en niños menores de 2 años, y en niños mayores debe utilizarse con precaución. No utilice este medicamento si tiene alergia a salicilatos o a cualquiera de sus excipientes

PRECAUCIONES:

Se debe evitar el contacto con los ojos y mucosas, si se produjera lave con abundante agua durante unos 15 minutos. No se pueden utilizar vendajes oclusivos, salvo indicación médica.

INTERACCIONES:

No utilice otras preparaciones que contengan sustancias queratolíticas o exfoliantes, limpiadores o jabones abrasivos, cosméticos o jabones con efecto de secante u otros medicamentos que se apliquen en la piel, salvo por prescripción médica. No utilice simultáneamente, a menos que se lo prescriba el médico, otros medicamentos que contengan salicilatos, aunque no sean de aplicación en la piel, ya que puede aumentar significativamente el riesgo de salicilismo que se caracteriza por confusión, mareos, dolor de cabeza fuerte y continuado, ruido en los oídos y palpitaciones

REACCIONES ADVERSAS:

Puede dar lugar a urticaria, ampollas y otras reacciones alérgicas más graves. Si se usa repetidamente puede producir dermatitis en piel sana.

CONSERVACIÓN:

Se debe conservar protegido de la luz y la humedad, y a temperatura inferior a 25 °C. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene el periodo de validez de 3 meses desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase

FECHA ÚLTIMA REVISION:

Febrero 2014