

## **ACETATO DE ALUMINIO, solución de (FMT)**

### **FORMA FARMACÉUTICA:**

Solución

### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Vía ótica  
Vía tópica

### **INDICACIONES Y POSOLOGÍA:**

Se emplea en inflamaciones del oído (otitis externa).

Uso cutáneo: se emplea, la solución diluida al 5-10 % en agua, como astringente y antiséptico de piel y mucosas para el tratamiento de eczemas, dermatitis y eritema.

Uso ótico: se aplican 2 ó 3 gotas en el oído, tres o cuatro veces al día.

Uso cutáneo: Se aplica en compresas frías.

### **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:**

Uso ótico: se debe inclinar la cabeza hacia el lado contrario del oído a tratar y dejar caer 2 ó 3 gotas.

### **SOBREDOSIS:**

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información toxicológica, tfno: 915620420.

### **EMBARAZO Y LACTANCIA:**

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### **USO EN NIÑOS:**

Debe utilizarse con precaución, siguiendo fielmente las instrucciones del médico.

### **EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:**

Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

### **OTRAS ADVERTENCIAS :**

No se han descrito otras precauciones especiales.

### **CONTRAINDICACIONES:**

No utilice este medicamento si tiene alergia al sulfato de aluminio o a cualquiera de los componentes de la fórmula. No utilice este medicamento si ha sufrido perforación timpánica o tiene lesiones ulceradas.

### **PRECAUCIONES:**

Se debe usar con precaución en niños.

**INTERACCIONES:**

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

**REACCIONES ADVERSAS:**

La posible toxicidad se debe al aluminio, pero el uso tópico conlleva pocos riesgos por la baja absorción. El contenido en ácido acético puede originar picor o irritación.

**CONSERVACIÓN:**

Conservar a temperatura inferior a 30°C. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

**PLAZO DE VALIDEZ:**

Esta fórmula magistral tiene el periodo de validez de 3 meses desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:**

Febrero 2014.