

## **ALPROSTADIL 30 mcg/0,3 ml inyección intracavernosa**

### **FORMA FARMACÉUTICA:**

Inyectables

### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Vía intracavernosa.

### **INDICACIONES Y POSOLOGÍA:**

Para el tratamiento de la disfunción eréctil se administra mediante inyección intracavernosa ó por vía intrauretral. Posología: En la inyección intracavernosa se empieza por 2,5 µg , se aumenta gradualmente hasta conseguir una dosis adecuada. Esta suele estar entre 5 y 20 µg, la dosis máxima recomendada es de 60 µg.

### **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:**

Inyección intracavernosa directa. Se recomienda una aguja de 30 de calibre. No se recomiendan dosis superiores a 60 mcg. La frecuencia de inyección recomendada es de no más de una vez al día y no más de 3 veces a la semana.

### **SOBREDOSIS:**

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

### **EMBARAZO Y LACTANCIA:**

No debe utilizarse en mujeres

### **USO EN NIÑOS:**

No usar en niños.

### **EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:**

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

### **CONTRAINDICACIONES:**

No es aconsejable la administración intracavernosa en pacientes con deformación anatómica del pene o con anemia drepanocítica, mieloma, leucemia etc. No utilice este medicamento si tiene alergia al principio activo (alprostadil) o a cualquiera de sus excipientes.

### **PRECAUCIONES:**

Pacientes tratados con anticoagulantes, tales como warfarina o heparina pueden tener mayor predisposición a sufrir hemorragias La inyección puede producir pequeñas hemorragias en el lugar de infección.

**INTERACCIONES**

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario

**REACCIONES ADVERSAS:**

Dolor durante la erección . También pueden producirse efectos locales: fibrosis, nódulos. Los efectos sistémicos son menos frecuentes, aunque se ha descrito hipotensión .

**CONSERVACIÓN:**

Conservar en nevera. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

**PLAZO DE VALIDEZ:**

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 1 mes desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:**

Julio 2014.