

ALPROSTADIL 40 mcg/0,2 ml inyección intracavernosa

FORMA FARMACÉUTICA:

Inyectables

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía intracavernosa.

INDICACIONES Y POSOLOGÍA:

Para el tratamiento de la disfunción eréctil se administra mediante inyección intracavernosa ó por vía intrauretral. Posología: En la inyección intracavernosa se empieza por 2,5 µg , se aumenta gradualmente hasta conseguir una dosis adecuada. Esta suele estar entre 5 y 20 µg, la dosis máxima recomendada es de 60 µg.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Inyección intracavernosa directa. Se recomienda una aguja de 30 de calibre. No se recomiendan dosis superiores a 60 mcg. La frecuencia de inyección recomendada es de no más de una vez al día y no más de 3 veces a la semana.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

No debe utilizarse en mujeres

USO EN NIÑOS:

No usar en niños.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS ADVERTENCIAS:

Este medicamento contiene 40% de ALCOHOL DESHIDRATADO, esta pequeña cantidad se corresponde con 80 mg/dosis.

CONTRAINDICACIONES:

No es aconsejable la administración intracavernosa en pacientes con deformación anatómica del pene o con anemia drepanocítica, mieloma, leucemia etc. No utilice este medicamento si tiene alergia al principio activo (alprostadil) o a cualquiera de sus excipientes.

PRECAUCIONES:

Pacientes tratados con anticoagulantes, tales como warfarina o heparina pueden tener mayor predisposición a sufrir hemorragias. La inyección puede producir pequeñas hemorragias en el lugar de infección.

INTERACCIONES

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:

Dolor durante la erección. También pueden producirse efectos locales: fibrosis, nódulos. Los efectos sistémicos son menos frecuentes, aunque se ha descrito hipotensión.

CONSERVACIÓN:

Conservar en nevera. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 1 mes desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Julio 2014.