

## ATENOLOL 2 MG/ML SUSPENSIÓN ORAL

### **FORMA FARMACÉUTICA:**

Suspensiones

### **VIA DE ADMINISTRACIÓN:**

Vía oral

### **INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:**

Medicamento betabloqueante, cardioselectivo a bajas dosis, empleado en hipertensión arterial, angina e infarto y arritmias.

Posología: Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a dosis y horas de administración. Dosis inicial 1 mg/kg/día.

### **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:**

Debe tomarse, a ser posible, separado de las comidas. Agitar antes de su administración

### **SOBREDOSIS:**

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

### **EMBARAZO Y LACTANCIA:**

Si esta o puede estar embarazada o en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### **USO EN NIÑO:**

Aceptado su uso en niños

### **EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:**

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

### **OTRAS:**

No se han descrito otras precauciones especiales.

### **CONTRAINDICACIONES:**

No utilice este medicamento si tiene alergia al principio activo o a cualquiera de sus excipientes.

**PRECAUCIONES:**

Tenga cuidado si tiene asma o dificultades respiratorias, diabetes, depresión, trastornos circulatorios, problemas cardíacos, renales, hepáticos o de tiroides, angina de Prinzmetal o ha sufrido alguna vez alguna reacción alérgica. Si siente mareo y fatiga con el atenolol no conduzca ni maneje maquinaria alguna.

Esta fórmula magistral contiene GLICEROL: Este medicamento puede producir dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

**INTERACCIONES:**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Cardiovasculares: bradicardia, hipotensión, edema, síndrome de Raynaud.

Sistema nervioso central: fatiga, letargo, dolor de cabeza, insomnio, confusión, pesadillas.

Gastrointestinal: estreñimiento, náuseas, diarrea.

Respiratorias: dificultad respiratoria y disnea a altas dosis.

**CONSERVACIÓN:**

Conservar en nevera. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

**PLAZO DE VALIDEZ:**

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:**

Marzo de 2014