

CITRATO SÓDICO Y POTÁSICO SOLUCIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

POTASIO CITRATO	11g
SODIO CITRATO	10g
ACIDO CITRICO	6.7g
JARABE SIMPLE	50ml
AGUA CONSERVANTE SIN PROPILENGLICOL c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES

- Alcalinizante urinario para prevenir y disolver los cristales de urato.
- Tratamiento de la acidosis metabólica secundaria a insuficiencia renal.
- Neutralizante del ácido gástrico.

POSOLOGÍA:

La dosis se ajustará a las necesidades del paciente. Puede ser utilizado en niños y adultos. Esta solución contiene por cada ml: 1mEq de sodio, 1mEq de potasio y el equivalente a 2mEq de bicarbonato.

La dosis habitual en niños es de 10-30 mEq de bicarbonato por dosis después de las comidas y antes de ir a dormir. De manera alternativa, se puede utilizar 2-3mEq/kg/día dividido en 3-4 dosis.

En adultos, se utiliza de 30-60mEq de bicarbonato después de las comidas y antes de ir a dormir.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Se reducen los efectos secundarios gastrointestinales si el medicamento se mezcla con agua o zumo y se toma después de las comidas con más líquido. Para su administración en neonatos, se puede hacer una dilución 1:4.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

Ver indicaciones y posología.

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.
- Dietas restringidas en sales.
- Oliguria o anuria.
- Alcalosis metabólica.
- Hipernatremia o hipocalcemia.

PRECAUCIONES:

- Debido al contenido en sodio del medicamento o a la incorrecta conversión en bicarbonato, utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión, edema periférico o pulmonar, insuficiencia hepática o renal, pacientes críticos o shock.
- Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
- Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo y parahidroxibenzoato de propilo.

INTERACCIONES:

Debido al efecto alcalinizante urinario, puede interactuar con diversos medicamentos eliminados por la orina. Prestar especial atención con el ácido acetilsalicílico y derivados, cimetidina, ranitidina, famotidina, antiácidos que contengan aluminio, anfetaminas y quinidina.

REACCIONES ADVERSAS:

Generalmente, este medicamento es bien tolerado. Pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago y en algunos casos, alcalosis metabólica.

CONSERVACION:

Conservar refrigerado (2-8°C) protegido de la luz y la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

11/07/2017