

DILTIAZEM 2% GEL

FORMA FARMACÉUTICA:

Geles

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

DILTIAZEM, HIDROCLORURO DE	2g
PROPILENGLICOL	10ml
HIDROXIETILCELULOSA	2g
AGUA CONSERVANTE c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía rectal

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES

Tratamiento de las fisuras anales.

POSOLOGÍA

Se pondrá aproximadamente el tamaño de un garbanzo del gel cada 8-12 horas (según indicación del médico) y aplíquela con un guante de uso médico desechable o con un bastoncillo sobre la fisura. No utilizar cánulas. La duración del tratamiento es de aproximadamente 4-8 semanas.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Aplíquese con un guante de uso médico desechable o con un bastoncillo de un solo uso sobre la fisura. No vuelva a tocar el gel o el envase con el guante o bastoncillo ya utilizado. No utilizar cánulas.

Lávese las manos antes y después de la administración.

SOBREDOSIS:

Si usted se ha aplicado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de administrarse este medicamento.

No hay estudios suficientes para afirmar su seguridad en el embarazo. Sólo se podrá emplear cuando el beneficio potencial justifique el posible riesgo para el feto.

USO EN NIÑO:

No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños.

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Se aconseja precaución durante la conducción de vehículos o el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión, por la posible aparición de vértigos y/o cefaleas.

OTRAS:

Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

No utilice esta fórmula si tiene alergia a alguno de sus componentes. Se incluyen pacientes con intolerancia o alergia a calcio-antagonistas.

PRECAUCIONES:

En ancianos se recomienda un especial control clínico, ya que son más susceptibles al efecto hipotensor, pudiendo necesitar menores dosis iniciales.

La interrupción del tratamiento debe hacerse de forma gradual.

Esta fórmula magistral puede producir irritación de la piel porque contiene propilenglicol. Esta fórmula magistral puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo y parahidroxibenzoato de propilo.

INTERACCIONES:

Consulte a su médico y farmacéutico si está tomando algún otro medicamento , incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:

Este medicamento presenta muy raramente efectos secundarios. Se puede notar escozor o picor en la zona perianal, dolor de cabeza, mareo o sensación de calor excesivo.

CONSERVACION:

Mantener el envase bien cerrado, protegido de la humedad y a temperatura inferior a 25°C. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

31/08/2017