

ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML SUSPENSIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensiones.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Tratamiento de hiperaldosteronismo primario. Tratamiento del edema asociado a insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico. Tratamiento de la hipertensión arterial

Posología: Neonatos: 0,5-1 mg/kg cada 8 horas

Niños: 1-3 mg/kg/día en una única dosis o repartido en 2-4 dosis. Dosis máxima 200 mg/día. La dosis debe ser reducida a 1-2 mg/kg para mantenimiento o cuando se asocie a otros diuréticos.

Adultos: 25-200mg/día. Máx:400 mg/día

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Se puede administrar con o sin alimentos. Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada. Agite bien el medicamento antes de administrarlo.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑOS:

Aceptado su uso en niños

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en caso de alergia a sulfamidas. No utilice este medicamento en caso de alergia al principio activo (espironolactona) o a alguno de sus excipientes.

PRECAUCIONES:

Diabetes. Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

INTERACCIONES:

Indique a su médico si está en tratamiento con suplementos de potasio, litio, ciclosporina, digoxina, triamtereno u otros medicamentos hipotensores. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:

Ginecomastia, disfunción eréctil, torpeza, erupción, sequedad de piel. Más raramente cefalea, somnolencia, alteraciones digestivas o hirsutismo.

CONSERVACIÓN:

Conservar en nevera. Proteger de la luz. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 28 días desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Abril 2014