

FOSFATO 1mmol/ml SOLUCIÓN ORAL (SOLUCIÓN DE JOULIE)

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

ACIDO ORTO FOSFORICO 85%	5.45g
FOSFATO DISÓDICO (12H ₂ O)	18.75g
AGUA CONSERVANTE SIN	
PROPILENGLICOL c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES

- Hipofosfatemia
- Raquitismo hipofosfatémico
- Osteomalacia

POSOLOGÍA:

Esta solución contiene por cada ml: 1mmol de fosfato (30mg de fósforo, 1mmol de fósforo, 95mg de fosfato) y 1mEq de sodio.

- Neonatos: 1mmol/kg/día dividido en 1-2 dosis. Puede aditivarse a la leche materna (la solubilidad en leche es 1.2mmol de fosfato en 100ml; si además se añade calcio, es necesario contactar con el servicio de farmacia para estudiar la solubilidad).
- Niños 1mes-4 años: 2-3mmol/kg/día dividido en 2-4 dosis (máximo 48mmol por dosis). La dosis debe ajustarse individualmente.
- Niños 5-17 años: 2-3mmol/kg/día dividido en 2-4 dosis (máximo 97 mmol por dosis). La dosis debe ajustarse individualmente.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Para su administración en neonatos, se puede hacer una dilución 1:4.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

Ver indicaciones y posología.

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES:

- Enfermedad cardíaca, deshidratación, diabetes mellitus, restricción de sodio, hipoparatiroidismo, pancreatitis aguda.
- Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo y parahidroxibenzoato de propilo.

INTERACCIONES:

Glucocorticoides, mineralcorticoides, corticotropina, anabolizantes, medicamentos que contienen calcio (incluyendo suplementos dietéticos o antiácidos), hidróxido de aluminio, hormona paratiroidea (PTH), suplementos de calcio, vitamina D.

REACCIONES ADVERSAS:

Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipocalemia, hipernatremia, fallo renal agudo.

CONSERVACION:

Conservar refrigerado (2-8°C) protegido de la luz y la humedad.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

12/07/2017