

5-FLUOROURACILO 5% pasta

FORMA FARMACÉUTICA:

Pasta

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN:

100 g

COMPOSICIÓN:

FLUOROURACILO	5 g
VASELINA FILANTE	95 g

MATERIAL Y EQUIPO:

El general para la preparación de pastas. Cabina de flujo laminar vertical.

METODOLOGÍA:

PG de Elaboración de pastas

MÉTODO ESPECÍFICO:

1. Pesar con exactitud el principio activo y pulverizar finamente.
2. Incorporar la cantidad suficiente de vaselina para completar los 100 g.
3. Homogenizar con ayuda de pistilo.
4. Envasar en tubo de aluminio.
5. Etiquetar.

ENTORNO:

En cabina de flujo laminar vertical

ENVASADO:

En tubo de aluminio.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO:

Pasta de color blanquecino.

PLAZO DE VALIDEZ:

2 meses

INDICACIONES Y POSOLOGÍA:

Por vía tópica en el tratamiento de lesiones cutáneas malignas y premalignas. En afecciones de la piel producidas por Papovavirus (verrugas y papilomas) especialmente para verrugas próximas a las uñas (periunguelas). Posología: Dos aplicaciones al día sobre las áreas afectadas durante 10-12 días.

OBSERVACIONES:

Antes de su aplicación, lavar la zona con agua y jabón y secar bien. Se aplica con una gasa o un algodón, utilizando guantes o un aplicador no metálico. Si la pomada entra en contacto con los ojos, nariz, boca o si se ensucia las manos, debe lavarse inmediatamente. Tras una o dos semanas, la piel enrojece y se pelará: esto es un efecto normal del tratamiento. Evite la exposición al sol o lámparas UV.

EVIDENCIA CIENTÍFICA:

Categoría I: presenta estudios de estabilidad y experiencia clínica

BIBLIOGRAFÍA:

Real Farmacopea Española. 1ª Ed. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo,; 2005 pag 1648.

Formulario de Murcia

Martindale 1ª Ed pag 689

Trissel LA. Trissel's Stability of Compounded Formulations. 3ª Ed. 2005.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Julio 2014