

ISONIAZIDA 50mg/ml JARABE

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

ISONIAZIDA	5000mg
AGUA CONSERVANTE SIN PROPILENGLICOL	50ml
SORBITOL 70% c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES

Profilaxis y tratamiento de la tuberculosis.

POSOLOGÍA

- Profilaxis de tuberculosis: 10mg/kg/día (máximo 300mg), 6-12 meses.
- Tuberculosis: prevención en pacientes VIH (+) con test cutáneo (+) pero sin evidencia de infección:
 - 10-15 mg/kg/día (máx. 300mg), 9 meses.
 - 20-30 mg/kg/2 veces semana (máximo 900mg/dosis), 9 meses.
- Tuberculosis: tratamiento (asociado a otros tuberculostáticos):
 - 10-15 mg/kg/día (máximo 300mg)
 - 20-30 mg/kg/2 veces semana (máximo 900mg/dosis).

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

- Se administrará preferentemente en ayunas, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas, salvo que aparezcan molestias gástricas.
- Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

Ver indicaciones y posología.

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

- Alergia a Isonizida o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Enfermedad hepática grave o daño hepático al tomar isoniazida previamente.

PRECAUCIONES:

- Insuficiencia renal, neuropatía (diabética o alcohólica), historial de psicosis o convulsiones.
- Los efectos neuropáticos de la isoniazida pueden prevenirse mediante la administración de piridoxina (vitamina B6) a dosis de 1-2 mg/kg/día.
- Realizar controles periódicos de la función hepática.
- Este medicamento contiene sorbitol. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar/usar este medicamento.
- Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo y parahidroxibenzoato de propilo.

INTERACCIONES:

- Anticoagulantes, fenitoína o disulfiram.
- Si está tomando algún antiácido tómelo al menos 1 hora antes de administrar la isoniazida.
- Los alimentos reducen significativamente la absorción intestinal.
- Alimentos como el queso (suizo o Gruyere) o el atún pueden provocar cefalea, rubor, mareo, escalofríos o diarreas.

REACCIONES ADVERSAS:

Alteraciones digestivas: náuseas, vómitos, dispepsia y sequedad de boca.

Alteraciones hepáticas: elevación de las transaminasas, hepatitis o ictericia.

Neuropatía periférica.

CONSERVACION:

Conservar refrigerado (2-8°C) protegido de la luz y la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración.

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

24/09/2017