

LEVOFLOXACINO 50mg/ml SUSPENSIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensiones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

LEVOFLOXACINO	5000mg
GLICEROL	5ml
METILCELULOSA 1%	50ml
JARABE SIMPLE c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES

- Antibiótico (quinolonas)

POSOLOGÍA:

En niños, las fluoroquinolonas no son habitualmente una primera opción, pero después de evaluar el balance beneficio-riesgo, pueden ser una alternativa razonable en situaciones donde no hay otra terapia segura y efectiva (por ejemplo, multirresistencias), o no es posible la administración parenteral y no hay otro agente efectivo.

El uso de levofloxacino en niños menores de 6 meses no ha sido estudiado.

No hay datos sobre seguridad en administración durante más de 14 días.

Las siguientes dosis se refieren a pautas habituales para microorganismos sensibles. En el caso de microorganismos concretos, o pacientes con insuficiencia renal, estas pautas pueden variar.

- Niños de entre 6 meses y 5 años: 8-10mg/kg cada 12 horas.
- Niños mayores de 5 años: 10mg/kg/dosis cada 24 horas (dosis máxima 750mg/día).
- Adultos: 500mg/día.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Agitar bien antes de usar.

Se recomienda tomar este medicamento con el estómago vacío (1 hora antes o 2 horas después de la comida).

Administrar al menos 2 horas antes ó 2 horas después de la toma de antiácidos que contengan magnesio o aluminio, de sucralfato, sales de hierro, multivitamínicos o preparados que contengan zinc.

Mantener una correcta hidratación durante el tratamiento.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

Ver indicaciones y posología.

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Algunas reacciones adversas (por ejemplo, mareo, vértigo, somnolencia, alteraciones visuales...) pueden alterar la capacidad de los pacientes para concentrarse y reaccionar y, por tanto, constituir un riesgo en aquellas situaciones en que estas capacidades sean especialmente importantes (por ejemplo, al conducir un vehículo o utilizar maquinaria).

OTRAS:

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación.
- Historia de tendinitis o ruptura de tendón asociado al uso de quinolonas.
- Epilepsia.

PRECAUCIONES:

- En niños, las fluoroquinolonas no son habitualmente una primera opción, pero después de evaluar el balance beneficio-riesgo, pueden ser una alternativa razonable en situaciones donde no hay otra terapia segura y efectiva (por ejemplo, multirresistencias), o no es posible la administración parenteral y no hay otro agente efectivo.
- Alteraciones cardíacas (las fluoroquinolonas pueden prolongar el intervalo QTc).
- Alteraciones en el metabolismo de la glucosa (las fluoroquinolonas pueden producir hipoglucemia)
- Hepatotoxicidad, hipersensibilidad, fotosensibilidad.
- Tendinitis, ruptura de tendón, neuropatía periférica y efectos en el sistema nervioso central.
- Colitis pseudomembranosa
- Miastenia gravis
- Enfermedad renal
- Artritis reumatoide
- Este medicamento puede producir dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea porque contiene glicerol.
- Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

INTERACCIONES:

Antiácidos con aluminio o magnesio, sucralfato, sales de hierro, ciclosporina, laxantes, anfotericina B, corticoides, agonistas beta-adrenérgicos, teofilina, anticoagulantes orales.

REACCIONES ADVERSAS:

Dolor torácico, edema, convulsiones, dolor de cabeza, insomnio, prurito, rash cutáneo, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, dispepsia, náuseas, vómitos, vaginitis, candidiasis, disnea, aumento de transaminasas, hipotensión, vértigo, trastornos visuales.

CONSERVACION:

Conservar refrigerado (2-8°C) protegido de la luz y la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 14 días desde su elaboración y un periodo de validez de 8 días una vez abierto.

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

21/07/2017