

TACROLIMUS 0.5 MG/ML SUSPENSION ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensiones

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Profilaxis de rechazo del trasplante renal y cardíaco.

Posología: Lactantes y niños inicial 0.5 mg/kgc/12horas, ajustar la dosis de acuerdo con los niveles plasmáticos de tacrolimus. Es importante tomarlo cada día a la misma hora.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Administrar preferente en ayunas, junto con un vaso de agua. Agite bien el medicamento antes de administrarlo. Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como recuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

Aprobado su uso en niños

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES:

Evitar la luz directa o fuentes de rayos ultravioleta. Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que debería tenerse en cuenta en pacientes con intolerancia a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

INTERACCIONES:

Puede interactuar con diversos antibióticos, ciclosporina, diltiazem, fluconazol, ibuprofeno, diuréticos o antiepilépticos. Indique a su médico todos los medicamentos que esté tomando

REACCIONES ADVERSAS:

Puede aparecer dolor de pecho, vértigo, dolor de cabeza, picor y fotosensibilidad

CONSERVACIÓN:

Temperatura ambiente

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula tiene una validez de 45 días desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Junio de 2014