

VERAPAMILLO 20 mg/ml suspensión oral

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensiones

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

INDICACIONES Y POSOLOGÍA:

Tratamiento de angina e hipertensión. Antiarrítmico y vasodilatador, bloqueante de la cadena del calcio. Posología: En niños máximo: 10 mg/ Kg/día repartidos en varias tomas Posología: En niños máximo: 10 mg/ Kg/día repartidos en varias tomas

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Agite bien este medicamento antes de administrarlo Tomar preferente con leche y alimentos.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento

USO EN NIÑOS:

Aceptado su uso en niños

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS ADVERTENCIAS:

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

CONTRAINDICACIONES:

No utilice este medicamento si tiene alergia al verapamilo o a cualquiera de los excipientes de la fórmula. Este medicamento está contraindicado en ciertas dolencias cardíacas.

PRECAUCIONES:

Deberá utilizarse con precaución en la fase aguda del infarto de miocardio. Los pacientes con insuficiencia cardíaca o depresión de la función ventricular deberán ser compensados antes de iniciarse el tratamiento con verapamilo. En insuficiencia

hepática ó renal la dosis se ajustará individualmente. En sujetos con disminución de la transmisión neuromuscular deberá utilizarse con precaución (especialmente los afectados por el síndrome de Duchenne).

INTERACCIONES:

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:

Cardiovasculares: hipotensión, bradicardia, bloqueo A-V. SNC: cefalea, mareo, parestesia, temblor y trastorno extrapiramidal. Gastrointestinales: náuseas, vómitos, estreñimiento, de malestar abdominal. Hepáticas: elevación de enzimas hepáticas. Óticas: tinnitus. Respiratorias: puede precipitar insuficiencia de la función muscular respiratoria en pacientes con distrofia muscular de Duchenne.

CONSERVACIÓN:

Conservar en nevera protegido de la luz. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un periodo de validez de 2 meses desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Julio 2014.