

## HOJA DE ADMINISTRACIÓN BEVACIZUMAB+XELIRI

<b>Descripción</b>
<b>Protocolo: BEVACIZUMAB+XELIRI (Bevacizumab, Irinotecan y Capecitabina)</b>
<b>Periodicidad:</b> cada 21 días
<b>Nº máximo de ciclos:</b> Hasta progresión o desarrollo de toxicidad inaceptable
<b>Indicaciones:</b> Cáncer colorrectal metastásico
<b>Terapia de soporte</b>
<b>1. Capacidad emetógena:</b> Moderadamente emetógeno
<b>2. Hidratación:</b> NO
<b>3. Otros:</b> Atropina 250 mcg subcutánea previa a la administración de Irinotecán como profilaxis de la diarrea aguda u otros síntomas colinérgicos (diarrea precoz, sudoración, calambres abdominales, lagrimeo, miosis y salivación). También como tratamiento de los síntomas colinérgicos si éstos se producen

Orden	Días	Tadm	Mezcla	Vía adm	Advertencias especiales	Estabilidad conservación	Observaciones a la adm
1	1	90 min (1ª adm) Si dosis inicial bien tolerada: 60 min (2ª adm) 30 min (Resto)	Bevacizumab 7,5 mg/kg SF 100 ml	IVc IVp	No agresivo Incompatible con G5% Lavar vía sólo con SF	48h 2-8°C (*)	Vigilar reacciones infusionales Monitorizar TA antes, durante y 1 h después de la adm
2	1	60-90 min	Irinotecán 200-250mg/m <sup>2</sup> G5% o SF 250 ml	IVc IVp	No agresivo	24h TA 48h 2-8°C (*)	Vigilar aparición de síntomas colinérgicos
3	1:14		Capecitabina 1.000 mg/m <sup>2</sup> /12 h	PO	Contiene lactosa	TA en el envase original hasta fecha de caducidad	Tomar con desayuno y cena (dentro de los 30 min siguientes) Tragar comprimidos enteros

(\*) Variabilidad según marca comercial: Consultad al SFH o etiqueta de la mezcla

SF: suero fisiológico 0,9%; G5%: suero glucosado 5%; TA: temperatura ambiente

Extravasación
<b>Bevacizumab:</b> No agresivo. <b>Irinotecan:</b> No agresivo.
Aplicar medidas habituales para el tratamiento de una extravasación

Bibliografía
1. NCCN Guidelines versión 3.2013. Colon Cancer/NCCN Guidelines Antiemesis v1.2013 Disponible en: <a href="http://www.nccn.org/index.asp">http://www.nccn.org/index.asp</a>
2. Protocol Summary for Palliative Combination Chemotherapy for Metastatic Colorectal Cancer Using Irinotecan, Bevacizumab and Capecitabine. [database on Internet] [Citado mayo de 2013]. Disponible en: <a href="http://www.bccancer.bc.ca/">http://www.bccancer.bc.ca/</a>
3. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Ficha técnica (FT) Avastin 25mg/ml concentrado para solución para perfusión. (Actualizado Febrero 2013) FT Irinotecán Actavis 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG (revisado Mayo 2009), FT Xeloda 150mg comprimidos recubiertos con película. (Actualizado Febrero 2013). [Citado Febrero 2014]. Disponible en <a href="http://www.agemed.es">http://www.agemed.es</a> .
4. Conde-Estévez D, Mateu-de Antonio J. Actualización del manejo de extravasaciones de agentes citostáticos. Farm Hosp. 2012; 36(1):34-42.