

HOJA DE ADMINISTRACIÓN RALTITREXED

| |
|--|
| Descripción |
| Protocolo: RALTITREXED |
| Periodicidad: Cada 21 días |
| Nº máximo de ciclos: Hasta progresión o desarrollo de toxicidad inaceptable |
| Indicaciones: Cáncer colorrectal irresecable o metastásico en pacientes no candidatos o que no toleran esquemas basados en fluoropirimidinas (fluorouracilo o capecitabina) |
| Terapia de soporte |
| 1. Capacidad emetógena: Mínimamente emetógeno |
| 2. Hidratación: NO |
| 3. Otros: - |

| Orden | Días | Tadm | Mezcla | Vía adm | Advertencias especiales | Estabilidad conservación | Observaciones a la adm |
|-------|------|--------|---|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | 1 | 15 min | Raltitrexed 3 mg/m ² SF o G5% 50- 250 ml | IVp IVc | No agresivo | 24 h a 25°C (*) | |

(*) Variabilidad según marca comercial: Consultad al SFH o etiqueta de la mezcla

SF: suero fisiológico 0,9%; G5%: suero glucosado 5%; TA: temperatura ambiente

| Extravasación |
|---|
| Raltitrexed: No agresivo |
| Aplicar medidas habituales para el tratamiento de una extravasación |

| Bibliografía |
|---|
| 1. NCCN Guidelines versión 3.2013. Colon Cancer/NCCN Guidelines Antiemesis v1.2013 Disponible en: http://www.nccn.org/index.asp |
| 2. BCCA Protocol Summary for Palliative Chemotherapy for Metastatic Colorectal Cancer Using Raltitrexed in Patients with Previous Fluorouracil Toxicity. [database on Internet] [Citado mayo de 2013]. Disponible en: http://www.bccancer.bc.ca/ |
| 3. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Ficha técnica Tomudex [Actualizado Abril 2002] [Citado Octubre de 2013]. Disponible en http://www.agemed.es . |
| 4. Conde-Estévez D, Mateu-de Antonio J. Actualización del manejo de extravasaciones de agentes citostáticos. Farm Hosp. 2012; 36(1):34-42. |