

HOJA DE ADMINISTRACIÓN TOMOX (RALTITREXED+OXALIPLATINO)

Descripción
Protocolo: TOMOX (RALTITREXED + OXALIPLATINO)
Periodicidad: cada 21 días
Nº máximo de ciclos: Hasta progresión o desarrollo de toxicidad inaceptable
Indicaciones: Cáncer colorrectal irresecable o metastático en pacientes no candidatos o que no toleran esquemas basados en fluoropirimidinas (fluorouracilo o capecitabina)
Terapia de soporte
1. Capacidad emetógena: Moderadamente emetógeno
2. Hidratación: No
3. Otros: No usar crioterapia, puede exacerbar las disestesias laringo-faríngeas. Evitar bebidas frías y aire frío, especialmente los días 3-5 tras la administración de oxaliplatino

Orden	Días	Tadm	Mezcla	Vía adm	Advertencias especiales	Estabilidad conservación	Observaciones a la adm
1	1	15 min	Raltitrexed 3 mg/m ² SF o G5% 50- 250 ml	IVp IVc	No agresivo	24h a 25°C (*)	
2	1	120-360 min	Oxaliplatino 130 mg/m ² G5% 250-500ml	IVp IVc	Irritante alto riesgo Incompatible con SF Lavar vía sólo con G5%	24h a 2-8°C 6h a 25°C (*)	Vigilar reacción de hipersensibilidad

(*) Variabilidad según marca comercial: Consultad al SFH o etiqueta de la mezcla
SF: suero fisiológico 0,9%; G5%: suero glucosado 5%; TA: temperatura ambiente

Extravasación
Raltitrexed: No agresivo
Oxaliplatino: Irritante de alto riesgo. Medidas físicas: Calor moderado seco local durante 30 min. Alternativamente 15 minutos cada 6 horas por dos días.
Aplicar medidas habituales para el tratamiento de una extravasación

Bibliografía
1. NCCN Guidelines versión 3.2013. Colon Cancer/NCCN Guidelines Antiemesis v1.2013 Disponible en: http://www.nccn.org/index.asp
2. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Ficha técnica (FT) Oxaliplatino Accord 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG [Actualizado Abril 2012] [Citado Mayo de 2013]. FT Tomudex [Actualizado Abril 2002] [Citado Febrero de 2014]. Disponible en http://www.agemed.es .
3. Conde-Estévez D, Mateu-de Antonio J. Actualización del manejo de extravasaciones de agentes citostáticos. Farm Hosp. 2012; 36(1):34-42.
4. S. Cascinu, F. Graziano, F. Ferraú, V. Catalano, C. Massacesi, D. Santini. Raltitrexed plus oxaliplatin (TOMOX) as first-line chemotherapy for metastatic colorectal cancer. A phase II study of the Italian Group for the Study of Gastrointestinal Tract Carcinomas (GISCAD). Ann Oncol. 2002 May;13(5):716-20

