

HOJA DE ADMINISTRACIÓN XELOX

Descripción
Protocolo: XELOX (Oxaliplatino y Capecitabina)
Periodicidad: cada 21 días
Nº máximo de ciclos: Hasta un máximo de 8 ciclos en adyuvancia o hasta progresión o desarrollo de toxicidad inaceptable en la enfermedad metastásica
Indicaciones: Tratamiento adyuvante en cáncer colorrectal y tratamiento del cáncer colorrectal metastásico.
Terapia de soporte
1. Capacidad emetógena: Moderadamente emetógeno
2. Hidratación: NO
3. Otros: No usar crioterapia, puede exacerbar las disestesias laringo-faríngeas. Evitar bebidas frías y aire frío, especialmente los días 3-5 tras la administración de oxaliplatino.

Orden	Días	Tadm	Mezcla	Vía adm	Advertencias especiales	Estabilidad conservación	Observaciones a la adm
1	1	120-360 min	Oxaliplatino 130 mg/m ² G5% 250-500 ml	IVp IVc	Irritante alto riesgo Incompatible con SF Lavar la vía solo con SG5%	24h a 2-8°C 6h TA (*)	Vigilar reacción de hipersensibilidad
2	1:14		Capecitabina 1000 mg/m ² /12h	PO	Contiene lactosa	TA en el envase original hasta fecha de caducidad	Tomar con desayuno y cena (dentro de los 30 min siguientes) Tragar comprimidos enteros

(*) Variabilidad según marca comercial: Consultad al SFH o etiqueta de la mezcla

SF: suero fisiológico 0,9%; G5%: suero glucosado 5%; TA: temperatura ambiente

Extravasación
Oxaliplatino: Irritante de alto riesgo. Medidas físicas: calor moderado seco local durante 30 min, después, 15 minutos cada 6 horas durante dos días.
Aplicar medidas habituales para el tratamiento de una extravasación

Bibliografía
1. NCCN Guidelines versión 3.2013. Colon Cancer/NCCN Guidelines Antiemesis v1.2013 Disponible en: http://www.nccn.org/index.asp
2. BCCA Protocol Summary for Palliative Combination Chemotherapy for Metastatic Colorectal Cancer Using Oxaliplatin and Capecitabine. [database on Internet] [Citado mayo de 2013]. Disponible en: http://www.bccancer.bc.ca/
3. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Ficha técnica (FT) Oxaliplatino Accord 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG [Actualizado Abril 2012]. FT Xeloda 150mg comprimidos recubiertos con película. [Actualizado Febrero 2013] [Citado Febrero de 2014]. Disponible en http://www.agemed.es .
4. Conde-Estévez D, Mateu-de Antonio J. Actualización del manejo de extravasaciones de agentes citostáticos. Farm Hosp. 2012; 36(1):34-42.