

POSOLOGIA

Valganciclovir se administra por vía oral



La dosis recomendada es según prescripción médica

¿CÓMO se debe TOMAR Valganciclovir?

- Debe tomarlo con alimentos
- Los comprimidos deben tomarse enteros, sin trocear, masticar, ni chupar.
- El polvo para solución oral debe ser reconstituido antes de su administración.
- Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ HACER SI...?:

- Si se ha olvidado una dosis: tómela lo antes posible. Si ha transcurrido mucho tiempo y esta cercano a la próxima dosis, no la tome y espere a la siguiente dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico

¿Cuándo NO debe tomar Valganciclovir?

- Si usted es alérgico a valganciclovir, cualquiera de sus componentes, o fármacos relacionados con valganciclovir como ganciclovir, aciclovir o famciclovir.
- Si usted está o sospecha estar embarazada y en periodo de lactancia.

PRECAUCIONES

- Adopte 2 medidas anticonceptivas eficaces si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 30 días (si es mujer) o hasta 90 días (si es hombre) tras finalizar el tratamiento
- Consulte a su médico o farmacéutico antes de vacunarse
- Evite conducir o usar maquinaria peligrosa si se encuentra mareado o somnoliento

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal:

- Antivíricos: didanosina, tenofovir, zidovudina
- Antibiótico: trimetoprima, imipenem-cilastatina
- Micofenolato de mofetilo
- Probenecid

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dificultad al respirar. Tos
- Diarrea. Náuseas y vómitos. Gases o estreñimiento.
- Alteraciones del gusto. Llagas en la boca
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas
- Ansiedad, depresión o alucinaciones
- Convulsiones. Dolor de cabeza. Insomnio
- Alteraciones visuales y en el oído
- Cansancio
- Infección de orina.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...)
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- En caso de sobredosis

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Valcyte® 450 mg

comprimidos con cubierta pelicular

Valganciclovir

Vía oral



VALGANCICLOCIR

VALCYTE®

Comprimidos 450 mg

Solución oral 50mg/ml

Nombre paciente:

Fecha: