

## POSOLOGÍA

DASATINIB se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



### ¿CÓMO se debe TOMAR Dasatinib?

- Puede tomarse con o sin alimentos.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de la toma.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario

### ¿QUÉ Hacer SI...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

### ¿Cuándo NO debe tomar Dasatinib?

- Si usted es alérgico a dasatinib así como a cualquier de los componentes del comprimido como lactosa.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

## PRECAUCIONES

- Si tiene una enfermedad hepática
- Si tiene una enfermedad del corazón
- Si toma inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol...) o antagonistas-H2 (ranitidina), antiácidos.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 4 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con cremas con filtros físicos con protección superior a 15.

## INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol.
- Antibióticos: eritromicina, claritromicina, telitromicina.
- Antivirales: ritonavir.
- Corticoides: dexametasona.
- Antiepilépticos: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital.
- Tratamiento para la tuberculosis: rifampicina.
- Hierba de San Juan o hipérico

## EFECTOS ADVERSOS

Las reacciones adversas más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Diarrea, náuseas.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.
- Erupción cutánea, picor.
- Dificultad para respirar, tos, palpitaciones.
- Dolor de cabeza, mareo.
- Aumento o disminución del peso,
- Fatiga, cansancio
- Dolor muscular y óseos.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

### **Avise rápidamente a su médico si tiene:**

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Signos cardiacos como palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar
- En caso de sobredosis.

## CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad

## CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

## ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

## RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº COMPRIMIDOS/DÍA			Frecuencia
	20 mg	50 mg	70 mg	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

## CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

LOGO HOSPITAL



## INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

**SPRYCEL™ 20 mg**

comprimidos recubiertos con película / Dasatinib

Via oral

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

**SPRYCEL™ 50 mg**

comprimidos recubiertos con película / Dasatinib

Via oral

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

**SPRYCEL™ 70 mg**

comprimidos recubiertos con película / Dasatinib

Via oral

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

## DASATINIB

### Sprycel®

Comprimidos 20, 50 y 70 mg

Nombre del paciente:

Fecha:

- Zumo de pomelo