

## POSOLOGIA

LAPATINIB se administra por **vía oral**. La dosis recomendada es según prescripción médica.



### COMO se debe TOMAR Lapatinib?

- Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario

### QUÉ HACER SI...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

### Cuando NO debe tomar Lapatinib?

- Si usted es alérgico a lapatinib así como a cualquiera de los componentes de los comprimidos.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

## PRECAUCIONES

- Si ha tenido o tiene algún problema de hígado.
- Si padece problemas de corazón.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15.

## INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol.
- Antibióticos: eritromicina, claritromicina, telitromicina.
- Antivirales: atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir.
- Antiepilépticos : fenobarbital, carbamazepina, fenitoína.
- Antiulcerosos: omeprazol, ranitidina.
- Hierba de San Juan o hipérico.
- Zumo de pomelo

## EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Palpitaciones.
- Diarrea, náuseas.
- Erupción cutánea, sequedad de piel, enrojecimiento en manos y pies
- Dolor, enrojecimiento, o llagas en la boca
- Dificultad al respirar.
- Fatiga e insomnio.
- Cansancio
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

### **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Palpitaciones
- Dificultad para respirar
- Diarreas severas
- En caso de sobredosis.

### CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad

### CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

### RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº COMPRIMIDOS	Frecuencia
	250mg	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

### COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

LOGO HOSPITAL



### INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



LAPATINIB

Tiverb®

Comprimidos 250 mg

Nombre del paciente:

Fecha: