

administra per via
nada és segons
dica .



PRENDRE Melfalà?

Prendre fora dels menjars, 1
o 2 hores després dels àpats.
Acte amb la pell. Renti's les
mànec i després de la presa.
No s'han d'empassar sencers
amb aigua, sense mastegar, ni
amb llet, ni dissoldre.
Prendre sempre el mateix horari.
Prendre freqüentment.

Si s'ha oblidat de prendre una dosi
de més aviat possible, si han
passat més de 12 hores esperi a la
dosi següent i no dobli mai la dosi.
No s'han de prendre més de
un cop i únicament repeteixi la dosi si
s'ha oblidat menys de 1 hora des de la
dosi anterior.
En cas de dubte comenti-ho amb el seu
farmacèutic

Quan NO s'ha de prendre Melfalà?

- Si vostè és al·lèrgic a melfalà així com a qualsevol dels components del comprimit com lactosa.
- Si està embarassada o en període de lactància.

PRECAUCIONS:

- Si pateix malaltia hepàtica o renal greu
- Si ha sofert alguna malaltia que afecti de manera important l'absorció intestinal o si s'ha sotmès a una resecció quirúrgica de budell o estómac.
- Adopti 2 mesures anticonceptives si vostè o la seva parella pot quedar-se embarassada.
- Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de rebre vacunes.

INTERACCIONS:

Pregunti al seu metge o farmacèutic abans de prendre un medicament, vitamina o planta medicinal, especialment si pren:

- Aspirina
- Anticoagulants: acenocumarol o warfarina.
- Ciclosporina
- Digoxina

EFFECTES ADVERSOS:

Els efectes adversos més freqüents
significa que apareguin a totes les
persones són:

- Dolors musculars i a les articulacions
- Inflamació de cames i peus
- Caiguda lleu del cabell.
- Nàusees, vòmits, llagues a la boca
- Major susceptibilitat de pell a les
lesions. Cal prendre mesures higièniques.
- Picor a la pell, erupcions a la pell
- Pot augmentar el risc de infeccions.
esteu alerta amb els utensilis.

Comenti amb el seu metge o farmacèutic
si presenta algun d'aquests efectes
adversos o qualsevol altre que cregui
relacionat amb la medicació.

Avisi ràpidament al seu metge o farmacèutic

- Una reacció al·lèrgica greu (erupció de la pell, dificultats al respirar)
- Signes d'infecció com tos, dolor de coll, febre superior a 38° C, dificultats per orinar
- Signes de sagnat, femta negra, hematomes importants
- Convulsions
- En cas de sobredosi.

CONSERVACIÓ

els comprimits en el seu
original dins la nevera (entre 2
i 8 °C). **NO CONGELAR**



CADUCITAT

Després de la data de cadu-
ta indicada a l'envàs.

ADVERTÈNCIES

Medicaments fora de l'abast

Si el medicament es pot aconseguir a
la Farmàcia de l'Hospital,
la que li farà el seu metge
o farmacèutic.

Si queda alguna quantitat sobrant a la Farmàcia

Si teniu algun dubte o qüestions, les
necessitats o embarassades hauran de tenir
en compte d'evitar el contacte amb el
medicament o les càpsules.

RECOMANACIONS AL PACIENT

Notes:

Aquest tríptic NO conté tota la informació d'aquest
medicament i només pretén ser un resum per ajudar
al pacient amb el seu tractament.

Si té qualsevol dubte o necessita més informació
contacti amb el seu metge o farmacèutic

COM CONTACTAR

Telèfon Farmàcia

Horari

Logo Hospital



INFORMACIÓ MEDICAMENT

Melfalan
Wellcome 2 mg
Melfalan
comprimidos

Wellcome

MELFALÀ
MELFALAN®
Comprimits de 2 mg

Nom del Pacient:

Data: