

## POSOLOGIA:

SUNITINIB se administra por **vía oral**. La dosis recomendada es según prescripción médica.



## ¿CÓMO se debe TOMAR Sunitinib?

- Puede tomarse con o sin alimentos.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.
- Mantenga siempre el mismo horario.

## ¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 30 minutos desde la toma.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

## ¿CUÁNDO NO debe tomar Sunitinib?

- Si usted es alérgico a sunitinib, así como a alguno de los componentes de la cápsula como el manitol.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

## PRECAUCIONES:

- Si es diabético, controle regularmente la glucosa
- Si es hipertenso, controle regularmente la presión arterial.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15.

## INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): itraconazol, voriconazol, ketoconazol
- Antibióticos: eritromicina, claritromicina, telitromicina, rifampicina, rifabutina.
- Antivirales: atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir.
- Antiepilépticos: carbamazepina, fenobarbital, fenitoína.
- Fármacos que afectan el ritmo cardiaco: sotalol, procainamida, haloperidol, risperidona, fluoxetina, amitriptilina.
- Otros: dexametasona, metadona
- Hierba de San Juan o hipérico.
- Zumo de pomelo

## EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Hipertensión arterial.
- Insuficiencia cardiaca, arritmias.
- Dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, llagas y sequedad de boca, alteraciones del gusto, pérdida de la gana.
- Cambios en el color y caída del pelo.
- Cansancio, dolor de cabeza, mareos, dolor de las extremidades y dolor muscular.
- Erupciones cutáneas, cambios en el color de la piel, rash cutáneo, sequedad
- Hemorragia nasal, dificultad al respirar.
- Alteraciones en el color de la orina.
- Incremento del lagrimeo.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.
- Hipotiroidismo

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dolor abdominal agudo
- Dificultad para respirar, ansiedad, dolor en el pecho, sudor frío.
- Cefalea intensa, convulsiones
- En caso de sobredosis.

### CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original, a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

### CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento solo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

### RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DIAS	Nº CAPSULAS			Frecuencia
	12,5mg	25 mg	50mg	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

### COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



## INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

### SUTENT® 12,5 mg

cápsulas duras

Sunitinib

Vía oral

### SUTENT® 25 mg

cápsulas duras

Sunitinib

Vía oral

### SUTENT® 50 mg

cápsulas duras

Sunitinib

Vía oral

## SUNITINIB

SUTENT®

Cápsulas de 12,5mg,  
25mg y 50mg

Nombre del paciente:

Fecha: