

POSOLÓGIA

ANAGRELIDA se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.

Se recomienda repartir las cápsulas en dos tomas diarias.



¿CÓMO se debe TOMAR Anagrelida?

- Puede tomarse con o sin alimentos.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlas.
- Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 6 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO se debe tomar Anagrelida?

- Si usted es alérgico a anagrelida, así como a cualquiera de los componentes de la cápsula como lactosa.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

PRECAUCIONES:

- Si tiene una enfermedad hepática, renal o cardíaca moderada o grave
- Si ha padecido alguna enfermedad que afecte de manera importante la absorción intestinal o si se ha sometido a una resección quirúrgica de intestino o estómago.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Anticonceptivos orales
- Fluvoxamina
- Milrinona
- Omeprazol
- Teofilina
- Sucralfato
- Zumo de pomelo

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Cansancio.
- Dolor de cabeza, mareos, somnolencia.
- Náuseas, diarrea.
- Palpitaciones.
- Retención de líquidos.
- Erupciones en la piel y cambio del color.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Signos cardíacos y respiratorios como ansiedad, sudor frío, palpitaciones, dolor en el pecho, mareo, dificultad para respirar
- Dolor de cabeza intenso.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital o en su Farmacia habitual, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Xagrid® 0.5mg

Cápsulas duras

Clorhidrato de Anagrelida



ANAGRELIDA

XAGRID®

Cápsulas de 0.5 mg

Nombre del Paciente:

Fecha:

Diciembre 2010