

POSOLOGÍA

CAPECITABINA se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿CÓMO se debe TOMAR Capecitabina?

- Se toma por la mañana y por la noche, en los 30 minutos tras el desayuno y la cena.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Apunte el día de la semana que empieza el tratamiento. Seguir un diario de administración le ayudará a no equivocarse y saber cuando ha de terminar el tratamiento

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han pasado más de 6 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 hora desde la toma
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Capecitabina?

- Si usted es alérgico a capecitabina, fluorouracilo, así como a cualquiera de los componentes del comprimido como la lactosa.
- Si padece infecciones virales tratadas con sorivudina o brivudina (Nervinex®).
- En caso de deficiencia de dihidropirimidina dehidrogenasa (DPD).
- Si está embarazada o en período de lactancia.

PRECAUCIONES

- Si tiene problemas de hígado o riñón.
- Padece o ha padecido problemas de corazón o dolor en el pecho.
- Si es diabético.
- No tome el sol
- No tome bebidas alcohólicas.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Alopurinol
- Acenocumarol, warfarina,
- Antiepilépticos: Fenitoína
- Antiácidos.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Diarrea, vómitos, náuseas
- Cansancio
- Dolor, enrojecimiento, inflamación o llagas en la boca
- Enrojecimiento, dolor, hinchazón de las manos y pies
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.
- Dolor en el pecho.

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Signos cardiacos como palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº COMPRIMIDOS/DÍA		Frecuencia
	150 mg	500mg	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia:

Horario:

LOGO DEL HOSPITAL



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Xeloda™
Capecitabina
150 mg
Comprimidos
Vía oral



Xeloda™
Capecitabina
500 mg
Comprimidos
Vía oral



CAPECITABINA
XELODA®
Comprimidos 500, 150 mg

Nombre del paciente::

Fecha:

Diciembre 2010