

POSOLOGÍA

CLORAMBUCILO se administra por **via oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿COMO se debe TOMAR Clorambucilo?

- Se ha de tomar sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario

¿QUÉ hacer si ...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la toma siguiente y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico

¿Cuándo NO debe tomar Clorambucilo?

- Si usted es alérgico a clorambucilo así como a cualquiera de los componentes del comprimido como la lactosa.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

PRECAUCIONES:

- Si padece una enfermedad hepática grave o cardiaca.
- Si tiene riesgo de convulsiones.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción intestinal o se ha sometido a una reducción quirúrgica de intestino o estómago.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dolores musculares y articulaciones.
- Nauseas, vómitos.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Descamación de la piel
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar, etc.).
- Signos de infección como fiebre > 38°C , escalofríos, tos, dificultad al orinar.
- Convulsiones, confusión, alucinaciones.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dificultad para respirar
- Ojos o piel amarillentos
- Oscurecimiento de la orina o heces blanquecinas.
- Hinchazón de pies o tobillos
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original, **dentro de la nevera** (entre 2 y 8°). **NO CONGELAR**



CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico **NO** contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Leukeran 2 mg

Clorambucilo
comprimidos
Via oral

Wellcome

CLORAMBUCILO
LEUKERAN®
COMPRIMIDOS 2 mg

Nombre del Paciente:

Fecha:

Diciembre 2010