

INDICACIÓN

DARBEPOETINA se utiliza para la anemia

POSOLOGIA

Darbepoetina se administra por **vía subcutánea** (debajo de la piel)..

La dosis recomendada es según prescripción médica.

¿CÓMO se debe ADMINISTRAR Darbepoetina?

La administración de la inyección se debe realizar siguiendo los siguientes pasos:

1. Deje la pluma precargada fuera de la nevera, a temperatura ambiente, durante 30 minutos.




2. Lávese las manos cuidadosamente.

3. Sujete firmemente la pluma y retire la cubierta.



4. Desinfecte la piel de la zona de inyección con un algodón con alcohol.




5. Disponga la pluma orientada verticalmente formando un ángulo de 90°, sin presionar el botón rojo superior.

6. Para iniciar la administración:

- Presione el botón rojo e inmediatamente suelte. Oirá un primer clic.





- Mantenga la pluma en esta posición hasta oír un segundo clic.



7. Al terminar la inyección, automáticamente se retrae la aguja. Desinfecte la piel con alcohol.

8. Podrá observar las diferencias que presenta la pluma antes de usar (con protección de la aguja y sin protección), y después de utilizar. También observe los diferentes colores de la ventana.



Para cada administración, debe cambiar el lugar de inyección, alternando entre la parte trasera del brazo, el abdomen y la parte superior del muslo.

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han pasado más de 24 horas comuníquelo a su médico o farmacéutico.
- No doble nunca la dosis.

¿Cuándo NO se debe administrar Darbepoetina?

- Si usted es alérgico a darbepoetina o a cualquiera de los componentes de la solución.
- Hipertensión mal controlada

PRECAUCIONES

- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Si es alérgico al látex evite manipularlo.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal. Especialmente si toma:

- Ciclosporina o tacrolimus.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dolor de cabeza
- Dolor en el lugar de inyección
- Fatiga, cansancio
- Aumento de la presión arterial
- Ligeramente aumento del riesgo de coágulos en la sangre
- Dolor muscular y de las articulaciones
- Hinchazón de manos y piernas

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de éstos efectos o cualquier otro que crea que está relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar,...).
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Signos cardíacos y respiratorios como ansiedad, sudor frío, palpitaciones, dolor en el pecho, mareo, dificultad para respirar.
- Dolor de cabeza intenso, convulsiones
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga las jeringas en su envase original, **dentro de la nevera** (entre 2 y 8°C). **NO CONGELAR**



CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las jeringas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº INYECCIONES			Frecuencia
	150 mcg	300 mcg	500 mcg	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

LOGO HOSPITAL

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



DARBEOETINA ARANESP®

Nombre del paciente:

Fecha:

Diciembre 2010