

## INDICACIÓN

DARBEPOETINA se utiliza para la anemia.

## POSOLOGIA

Darbepoetina se administra por **vía subcutánea** (debajo de la piel).

La dosis recomendada es según prescripción médica.

## ¿CÓMO se debe ADMINISTRAR Darbepoetina?

La administración de la inyección se debe realizar siguiendo los siguientes pasos:

**1.** Deje la jeringa precargada fuera de la nevera, a temperatura ambiente, durante 30 minutos.


**2.** Lávese las manos cuidadosamente.

 **3.** Sujete firmemente la jeringa y retire la cubierta de plástico de la aguja.

**4.** Con la jeringa orientada verticalmente, expulse todo el aire desplazando el émbolo hacia arriba. Así, la jeringa precargada ya está lista para su uso.



**5.** Desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol y pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice, sin apretar




**6.** Introduzca la aguja en toda su longitud formando un ángulo de 45°.

**7.** Inyecte toda la solución de forma lenta y constante manteniendo la piel pellizcada. No deje de presionar el émbolo hasta haber administrado toda la dosis indicada por su médico.



**8.** Al terminar la inyección, retire la aguja sin soltar el émbolo y suelte la piel. Deje retroceder el émbolo y la aguja se esconderá para prevenir pinchazos. Desinfecte la piel con alcohol.



Para cada administración, debe cambiar el lugar de inyección, alternando entre la parte trasera del brazo, el abdomen y la parte superior del muslo.

## ¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han pasado más de 24 horas comuníquelo a su médico o farmacéutico.
- No doble nunca la dosis.

## ¿Cuándo NO se debe administrar Darbepoetina?

- Si usted es alérgico a darbepoetina o a cualquiera de los componentes de la solución.
- Hipertensión mal controlada

## PRECAUCIONES

- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Si es alérgico al látex evite manipularlo.

## INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Ciclosporina o tacrolimus.

## EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dolor de cabeza
- Dolor en el lugar de inyección
- Fatiga, cansancio
- Aumento de la presión arterial
- Ligero aumento del riesgo de coágulos en la sangre
- Dolor muscular y de las articulaciones
- Hinchazón de manos y piernas

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de éstos efectos o cualquier otro que crea que está relacionado con la medicación.

## Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar,...).
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Signos cardíacos y respiratorios como ansiedad, sudor frío, palpitaciones, dolor en el pecho, mareo, dificultad para respirar.
- Dolor de cabeza intenso, convulsiones
- En caso de sobredosis.

### CONSERVACIÓN

Mantenga las jeringas en su envase original, **dentro de la nevera** (entre 2 y 8°C). **NO CONGELAR**



### CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las jeringas.

### RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº INYECCIONES			Frecuencia
	150 mcg	300 mcg	500 mcg	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

### CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

LOGO HOSPITAL

## INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

AMGEN®  
**Aranesp® 150** microgramos  
solución inyectable en jeringa precargada  
Darbepoetín alfa  
Vía subcutánea o intravenosa

AMGEN®  
**Aranesp® 300** microgramos  
solución inyectable en jeringa precargada  
Darbepoetín alfa  
Vía subcutánea o intravenosa

AMGEN®  
**Aranesp® 500** microgramos  
solución inyectable en jeringa precargada  
Darbepoetín alfa  
Vía subcutánea o intravenosa

## DARBEOETINA ARANESP®

Nombre del paciente:

Fecha:

Abril 2011