

POSOLOGIA



ELTROMBOPAG se administra por **vía oral**.
La dosis recomendada es según prescripción médica.

CÓMO se debe TOMAR Eltrombopag?

- Debe tomarse en ayunas, 1 hora antes o 2 después de las comidas
- Tomar 4 horas antes o después de cualquier producto como antiácidos, productos lácteos o suplementos minerales que contengan hierro, calcio, magnesio, aluminio, selenio o zinc.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha pasado menos de 30 minutos de la toma.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO se ha de administrar Eltrombopag?

- Si usted es alérgico a Eltrombopag así como a alguno de los componentes de los comprimidos como el manitol.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia

PRECAUCIONES

- Si ha tenido o tiene algún problema en el hígado.
- Si sufre cataratas.
- Si está tomando anticonceptivos orales, terapia hormonal sustitutiva o si ha pasado recientemente por una intervención quirúrgica o ha estado encamado mucho tiempo.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Hipocolesterolemiantes: pravastatina, simvastatina, lovastatina, rosuvastatina, gemfibrozilo.
- Antivirales: lopinavir, ritonavir
- Antibióticos: ciprofloxacino, trimetropim
- Propafenona.
- Suplementos minerales que contengan hierro, calcio, magnesio, aluminio, selenio y zinc.
- Antiácidos que contengan sales de magnesio y aluminio.
- Metotrexate y topotecan.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Insomnio, dolor de cabeza.
- Hormigueo y adormecimiento de manos, pies, piernas y brazos.
- Ojos secos y cataratas.
- Náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, dolor abdominal.
- Erupción cutánea, picor y caída del pelo.
- Dolor muscular, articular, óseo y espasmos musculares.
- Fatiga, retención de líquidos en extremidades inferiores.

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de éstos efectos adversos o cualquier otro que crea que está relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar,...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Coloración amarillenta de la piel o mucosas.
- Orina más oscura de lo normal.
- Hinchazón, dolor o malestar en pierna.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº COMPRIMIDOS	Frecuencia
	MG	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

LOGO HOSPITAL



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

ELTROMBOPAG
REVOLADE®

Nombre del paciente:

Fecha:

Diciembre 2010