

POSOLOGIA

ETOPOSIDO se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿CÓMO se debe TOMAR Etoposido?

Eto-
posido?

- Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Los comprimidos deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.
- Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 hora desde la toma.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Etoposido?

- Si usted es alérgico a etoposido, así como a alguno de los componentes de la cápsula.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

PRECAUCIONES:

- Si tiene enfermedad hepática o renal grave
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma.

- Ciclosporina
- Ciclofosfamida, carmustina, lomustina, 5-Fluorouracilo, vinblastina, adriamicina, cisplatino, mitomicina.
- Anticoagulantes: warfarina, acenocumarol
- Antiepilépticos: fenitoína, fenobarbital.
- Fenilbutazona, salicilato sódico y ácido acetil salicílico.
- Pomelo y zumo de pomelo.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Molestias musculares, entumecimiento persistente, hormigueo o dolor en los pies y/o manos.
- Náuseas y vómitos, diarreas, molestias intestinales.
- Dolor de cabeza.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado, heces negras, sangre en orina y/o hematomas importantes.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



ETOPOSIDO

VEPESID®

Cápsulas de 50 mg

Cápsulas 100 mg

Nombre del Paciente:

Fecha:

Diciembre 2010