

POSOLOGIA

LOMUSTINA se administra por **via oral**

La dosis recomendada es según prescripción médica



¿CÓMO se debe TOMAR Lomustina?

- Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer. Preferiblemente por la noche.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.
- Mantenga siempre el mismo horario

¿QUÉ HACER SI...?:

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Lomustina?

- Si usted es alérgico a lomustina así como a cualquiera de los componentes de las cápsulas
- Si usted es celiaco
- Si está embarazada o en período de lactancia

PRECAUCIONES

- Si tiene enfermedad renal
- Si tiene una enfermedad hepática grave.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 6 meses después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antiasmáticos: teofilina
- Antiepilépticos: fenobarbital.
- Otros: cimetidina, aspirina.

No abuse del alcohol mientras está en tratamiento con lomustina.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos mas frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Náuseas, vómitos
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.
- Disminución del apetito
- Pérdida de peso
- Llagas en la boca

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original, a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº CÁPSULAS			Frecuencia
	10 mg	40 mg	100 mg	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

LOMUSTINA

CeeNU®

Cápsulas 10, 40 y 100 mg

Nombre paciente:

Fecha:

Diciembre 2010