

## POSOLOGÍA

MELFALAN se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica .



### ¿CÓMO se debe TOMAR Melfalán?

- Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Beba agua frecuentemente.

### ¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 hora desde la toma.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

### ¿Cuándo NO debe tomar Melfalán?

- Si usted es alérgico a melfalán así como a cualquiera de los componentes del comprimido como lactosa.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

### PRECAUCIONES:

- Si tiene enfermedad hepática o renal grave.
- Si ha padecido alguna enfermedad que afecte de manera importante la absorción intestinal o si se ha sometido a una resección quirúrgica de intestino o estómago.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

### INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Aspirina
- Anticoagulantes: acenocumarol, warfarina.
- Ciclosporina
- Digoxina

### EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Dolores musculares y en articulaciones, inflamación de piernas y pies.
- Caída leve del cabello.
- Náuseas, vómitos, llagas en la boca.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Picor y erupciones en la piel.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

### **Avise rápidamente a su médico si tiene:**

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Convulsiones
- En caso de sobredosis

### CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original dentro de la nevera (entre 2 i 8°). **NO CONGELAR**



### CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

### RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

### COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



## INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



**MELFALAN**  
**MELFALAN®**  
Comprimidos de 2 mg

Nombre del Paciente:

Fecha:

Diciembre 2010