

INDICACIÓN

PLERIXAFOR mejora la liberación de las células madre al torrente circulatorio (movilización) ayudando a recoger células madre hasta su trasplante.

POSOLOGIA

Plerixafor se administra por **vía subcutánea** (debajo de la piel).

La dosis recomendada es según prescripción médica.

Plerixafor se administra conjuntamente con otro medicamento llamado G-CSF.

Se debe administrar la primera dosis entre 6 y 11 horas antes de la recogida de las células madre.

¿CÓMO se debe ADMINISTRAR Plerixafor?

1. Lávese las manos cuidadosamente.
2. Visualizar el vial y no utilizar si se observan partículas en suspensión o un cambio de color


3. Quite el tapón del vial de Plerixafor y limpie con alcohol. Pinche el vial de Plerixafor con una jeringa (con graduaciones de 0,01ml) y extraiga la cantidad de Plerixafor que le ha prescrito su médico. Extraiga un poco más de líquido del necesario y en posición vertical quite las burbujas de aire y expulse líquido hasta la medida justa).

4. Escoja el lugar para pinchar y límpielo con alcohol. Pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice, sin apretar, e introduzca la aguja con un ángulo de 45° e inyecte lentamente el líquido.



5. Después de inyectar, retire la aguja y deje de pellizcar la piel. Desinfecte la piel con alcohol.

Para cada administración cambiar el lugar de inyección, alternando entre la parte exterior de la parte superior del brazo, el abdomen (a más de 2cm del ombligo) y la parte frontal del muslo.



¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han transcurrido más de 24 horas comuníquelo a su médico o farmacéutico.
- No doble nunca la dosis.

Cuándo NO se debe administrar Plerixafor?

- Si usted es alérgico a Plerixafor, así como a cualquiera de los componentes de la solución.

INTERACCIONES

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento, vitamina o planta medicinal.

PRECAUCIONES

- Si tiene o ha tenido problemas de corazón.
- Si tiene problemas de riñón.
- Si tiene antecedentes de mareos o malestar estando de pie o se ha desvanecido.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento, flatulencia.
- Enrojecimiento o irritación en el lugar de inyección
- Cefalea, mareos, sensación de cansancio o de malestar
- Dificultad para dormir
- Síntomas estomacales como dolor, hinchazón o molestias
- Sequedad de boca o entumecimiento alrededor de la misma
- Sudoración, enrojecimiento generalizado de la piel, dolor en las articulaciones, dolor muscular y de huesos

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de éstos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Dificultad para respirar.
- Erupción cutánea, hinchazón alrededor de los ojos, dificultad para respirar o falta de oxígeno, sensación de malestar estando de pie o sentado, mareos o desvanecimientos
- Siente dolor en la parte superior izquierda del abdomen (tripa) o en el extremo del hombro
- En caso de sobredosis

CONSERVACIÓN

Mantenga las inyecciones el vial en su envase original a temperatura ambiente, protegido de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital.

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los viales

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

CÓMO CONTACTAR:

Teléfono Farmacia:

Horario:

LOGO HOSPITAL



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

PLERIXAFOR

MOZOBIL®

Vial 24mg/1,2mL

Nombre del paciente:

Fecha:

Diciembre 2010