

## POSOLOGIA

TEMOZOLAMIDA se administra por **via oral**

La dosis recomendada es según prescripción médica.



## ¿CÓMO se debe TOMAR Temozolamida?

- Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.
- Mantenga siempre el mismo horario

## QUE HACER SI...?:

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

## Cuando NO debe tomar Temozolamida?

- Si usted es alérgico a temozolamida, dacarbazina, así como a alguno de los componentes de la cápsula como lactosa
- Si está embarazada o en periodo de lactancia

## PRECAUCIONES

- Si tiene enfermedad hepática o renal grave.
- Si tiene inmunosupresión severa
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

## INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma :

- Antiepilépticos: Ácido Valproico.
- Inmunosupresores: ciclosporina, tacrolimus
- Hierba de San Juan o hipérico.

## EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos mas frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, indigestión
- Dolor de cabeza, somnolencia, confusión, mareo, temblores, ansiedad, insomnio

- Caída del pelo, eritema, dermatitis, sequedad de la piel
- Hemorragia, edema.
- Disminución de las defensas, plaquetas y anemia
- Infecciones
- Pérdida de peso, anorexia, hiperglicemia
- Debilidad muscular, dolor articulaciones
- Fatiga
- Alteraciones del gusto
- Visión borrosa, alteraciones auditivas
- Tos, dificultades respiratorias

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dolor abdominal agudo
- Convulsiones, cefalea intensa, pérdida de visión
- En caso de sobredosis.

### CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad

### CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento solo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

### RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DIAS	Nº CAPSULAS					Frecuencia
	5 m g	2 0 m g	1 0 0 m g	1 4 0 m g	1 8 0 m g	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

### COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

LOGO HOSPITAL



## INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



**TEMOZOLAMIDA**  
**Temodal®**  
Cápsulas 5, 20, 100,  
140, 180 mg

Nombre paciente:

Fecha:

Diciembre 2010