

CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento solo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Vesanoid® 10 mg
cápsulas blandas
Tretinoína
10 mg



VIA ORAL

TRETINOINA
VESANOID®
Cápsulas de 10 mg

Nombre del Paciente:

Fecha:

Diciembre 2010

POSOLOGIA

TRETINOINA se administra por **via oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿CÓMO se debe TOMAR Tretinoína?

- Tomar siempre con las comidas o inmediatamente después.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de la toma.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.
- Mantenga siempre el mismo horario

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han pasado más de 6 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Tretinoína?

- Si usted es alérgico a tretinoína, isotretinoína, parabenos, vitamina A, soja o cacahuets.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Si intolerancia hereditaria a la fructosa.

PRECAUCIONES:

- Si padece enfermedad hepática grave.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante la absorción intestinal o si se ha sometido a una reducción quirúrgica de intestino o estómago.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 4 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Protéjase del sol con cremas con filtros físicos con protección superior a 15.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antibióticos: Tetraciclina, tigeciclina, eritromicina, rifampicina
- Antiepilépticos: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital.
- Antifibrinolíticos: ácido tranexámico, ácido aminocaproico,
- Inmunosupresores: ciclosporina, corticoides
- Vitaminas: Vitamina A
- Otros: diltiazem, verapamilo

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Dolor de cabeza
- Cansancio.
- Sequedad de boca
- Diarrea y estreñimiento
- Náuseas y vómitos
- Oscurecimiento de la piel y sequedad de la piel
- Dolor abdominal.
- Síntomas pseudogripales, fiebre

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dificultad para respirar, hipotensión, aumento de peso, hinchazón de las manos y pies, dolor en el pecho.
- Dolor de cabeza persistente
- En caso de sobredosis.