

INDICACIÓN

VORICONAZOL está indicado en el tratamiento de algunas infecciones producidas por hongos.

POSOLOGIA

Voriconazol se administra por vía **oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿CÓMO se debe TOMAR Voriconazol?

- Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlos.
- Si no puede tragar los comprimidos hay jarabe.
- Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ HACER SI...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han pasado más de 6 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Voriconazol?

- Si es usted alérgico a voriconazol así como a alguno de los componentes de los comprimidos o solución, como lactosa.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- No se recomienda utilizar voriconazol en pacientes que toman:
 - Antivirales: Efavirenz, Ritonavir.
 - Antiepilépticos: Carbamazepina, Fenobarbital.
 - Antituberculostáticos: Rifampicina.
 - Antialérgicos: Terfenazina, Astemizol.
 - Antiarrítmicos: Quinidina.
 - Inmunosupresores: Sirolimus.
 - Antimigrañosos: alcaloides ergotamínicos
 - Otros: Pimozida

PRECAUCIONES

- Si tiene enfermedad hepática o cardíaca.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15.

INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:
- Antiepilépticos: Fenitoina
 - Antituberculostáticos: Rifabutina
 - Inmunosupresores: ciclosporina, tacrolimus.

- Anticoagulantes: Warfarina, acenocumarol
- Benzodiazepinas
- Anticonceptivos orales
- Alcaloides de la vinca
- Otros: sulfonilureas, estatinas, omeprazol, indinavir.
- Hierba de San Juan o hipérico

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Alteraciones visuales
- Febrícula
- Erupción cutánea
- Náuseas, vómitos y diarrea
- Dolor de cabeza
- Hinchazón de las extremidades
- Dolor de estómago.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia:

Horario:

LOGO HOSPITAL



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



VORICONAZOL

Vfend®

Comprimidos 200 y 50 mg
Jarabe

Nombre del paciente:

Fecha:

Diciembre 2010