

Flecainida 20 mg/ml suspensión oral

Composición

Componentes	Cantidad
Flecainida	2.400 mg
*Ora Sweet-Ora Plus 1:1 c.s.p.	120 ml

* También puede utilizarse Ora Sweet SF

Modo de elaboración

1. Verter la flecainida en un mortero.
2. Añadir aproximadamente 20 ml del excipiente hasta formar una pasta homogénea.
3. Añadir unos 60 ml del excipiente en proporción geométrica con agitación.
4. Transferir a una probeta graduada.
5. Lavar el mortero con porciones del vehículo y transferir a la probeta hasta un volumen final de 120 ml.
6. Agitar durante unos 30 minutos hasta homogeneización de la suspensión y envasar sin dejar reposar en frasco topacio.

Caducidad y conservación

- Estabilidad: 60 días en nevera (2-8 °C) o temperatura ambiente.
- Conservación: en nevera. Proteger de la luz

Etiquetado

Servicio de Farmacia	Hospital
Flecainida 20 mg/ml, suspensión oral	
Conservar en nevera. Proteger de la luz. Agitar antes de usar.	
Fecha elab:	Fecha cad:
Lote:	
Observaciones:	

Observaciones

En la bibliografía consultada para la elaboración de esta fórmula los autores utilizan comprimidos de flecainida de 100 mg.

Bibliografía

- Allen LV, Erickson MA. Stability of baclofen, captopril, diltiazem hydrochloride, dypiridamol, and flecainide acetate in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health Syst Pharm 1996; 53: 2179-2184.
- Nahata M, Pai V, Hipple T. Pediatric drug formulations, 5.ª ed. Harvey Whitney. Cincinnati, 2003.
- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. Pediatric dosage handbook, 9.ª ed. Lexi-Comp Clinical Reference Library. Chicago, 2002.
- MICROMEDEX® Healthcare Series Integrated Index. Vol. 124. [Base de datos en internet]. Thomson MICROMEDEX.c1974-2005. Drugdex drug evaluations: FLECAINIDE. Disponible en: <http://mdxsefh.gpm.es>

Flecainida oral

Indicaciones

- Arritmias ventriculares.
- Taquicardia supraventricular, asociada o no al síndrome de Wolff-Parkinson-White

Posología

- Niños > 6 meses: 100-200 mg/m²/día o 1-8 mg/kg/día repartido en 2 o 3 tomas dependiendo de la edad del paciente. Algunos pacientes necesitan dosis mayores. Se recomienda que los incrementos de dosis se realicen a intervalos de 5 días con 50 mg/m²/día.
- Niños < 6 meses: dosis inicial 50 mg/m²/día repartida en 2-3 tomas.

Información al paciente

Los alimentos pueden reducir ligeramente la velocidad de absorción pero no afectan a la cantidad total absorbida.

Está descrita en un neonato una interacción de flecainida con productos lácteos, que requirió dosis más altas del fármaco por haber disminuido su absorción.

Los efectos proarrítmicos de flecainida observados en adultos pueden también producirse en los niños.

Se recomienda reducir gradualmente la dosis antes de su retirada.