

Indometacina 5 mg/ml suspensión oral

Composición

Componentes	Cantidad
Indometacina	500 mg
Jarabe simple c.s.p	100 ml

Modo de elaboración

1. Verter la indometacina en el mortero.
2. Añadir una pequeña cantidad de jarabe simple y trabajar hasta formar una pasta homogénea. Seguir añadiendo jarabe hasta que la mezcla adquiera una consistencia más fluida y transferir a una probeta graduada.
3. Usar jarabe simple para limpiar el remanente de fármaco del mortero y transferir a la probeta.
4. Enrasar hasta el volumen final con jarabe simple.
5. Agitar hasta obtener una suspensión homogénea y envasar, sin dejar reposar, en un frasco topacio.

Caducidad y conservación

- Estabilidad: 60 días en nevera (2-8 °C).
- Conservación: en nevera. Proteger de la luz.

Etiquetado

Servicio de Farmacia	Hospital
<u>Indometacina 5 mg/ml, suspensión oral</u>	
Conservar en nevera. Proteger de la luz. Agitar antes de usar.	
Fecha elab:	Fecha cad:
Lote:	
Observaciones:	

Observaciones

En la bibliografía consultada para la elaboración de esta fórmula parten de cápsulas de indometacina de 50 mg.

Bibliografía

- The Hospital for Sick Children. [página web en internet]. University of Toronto, c1999-2005. Indomethacin 5 mg/ml oral suspension. [Actualizado: 8 diciembre 2003]. Disponible en: <http://www.sickkids.ca/pharmacy/custom/indomethacin.asp>

Indometacina oral

Indicaciones

- Dolor moderado.
- Antiinflamatorio.

Posología

- Antiinflamatorio, procesos reumáticos (utilizar la dosis más baja efectiva).
Niños > 2 años: 1-2 mg/kg/día repartido en 2-4 tomas.
Dosis máxima: 4 mg/kg/día, no exceder 150-200 mg/día.

Información al paciente

Se puede administrar con comida, leche o antiácidos para disminuir los efectos adversos gastrointestinales.

Los alimentos pueden modificar la velocidad pero no la cantidad de fármaco absorbido.