

Ipecacuana jarabe

Composición

| Componentes | Cantidad |
|---|----------|
| Extracto fluido normalizado de ipecacuana | 7 ml |
| Acido clorhídrico 0,1N* | 2,5 ml |
| Jarabe simple c.s.p. | 100 ml |

* HCl 0,1N: diluir 8,83 ml de HCl concentrado hasta 1 litro con agua purificada.

Modo de elaboración

1. Medir el extracto y el HCl y mezclar.
2. Añadir al jarabe y homogeneizar.
3. Mantener en agitación durante 5 minutos.
4. Envasar en frascos topacio de volumen no superior a 30 ml.

Caducidad y conservación

- Estabilidad: 3 meses a temperatura inferior a 25 °C.
- Conservación: a temperatura inferior a 25 °C. Proteger de la luz.

Etiquetado

| | |
|--|------------|
| Servicio de Farmacia | Hospital |
| <u>Jarabe de ipecacuana oral</u> | |
| Conservar a temperatura < 25 °C. Proteger de la luz. | |
| Fecha elab: | Fecha cad: |
| Lote: | |
| Observaciones: | |

Observaciones

También se puede formular con glicerina al 10%. Existen otras fórmulas alternativas donde se sustituye el jarabe simple por agua purificada.

Bibliografía

- Formulario Nacional. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 2003.

Ipecacuana oral

Indicaciones

- Emético indicado en intoxicaciones producidas por vía oral, en pacientes e intoxicaciones en los que no esté contraindicado el vómito.

Posología

- Niños de 6-12 meses: 5-10 ml.
- Niños de 1-12 años: 15 ml.
- Adultos y niños mayores de 12 años: 15-30 ml.

No administrar a niños menores de 6 meses.

Si no se produce el vómito se puede repetir la dosis a los 20-30 minutos, sólo una vez. Las dosis deben recuperarse mediante lavado gástrico, si tras la segunda dosis no se produce el vómito.

Información al paciente

Beber a continuación del jarabe una gran cantidad de líquido (aproximadamente 1 litro en adultos o 15 ml/kg en niños). Estos líquidos pueden ser agua o zumo de fruta, pero no leche. En niños pequeños se puede invertir el orden, primero el líquido y luego el jarabe.

Después de su administración el paciente permanecerá erguido, nunca tumbado. En caso de niños pequeños deben mantenerse tumbados boca abajo.

El efecto emético aparece a los 15-30 minutos de su administración.