

Lidocaína 1% gel oral

Composición

Componentes	Cantidad
Lidocaína	1 g
Carboximetilcelulosa sódica	1 g
Agua conservans c.s.p.	100 ml

Modo de elaboración

1. Disolver la lidocaína en el agua conservans.
2. Dispersar la carboximetilcelulosa en parte de la mezcla anterior, homogeneizando bien.
3. Enrasar hasta el volumen final deseado.
4. Dejar reposar 24 horas en frigorífico.
5. Envasar en frasco topacio.

Caducidad y conservación

- Estabilidad: 60 días en nevera (2-8 °C).
- Conservación: en nevera. Proteger de la luz.

Etiquetado

Servicio de Farmacia	Hospital
<u>lidocaína 1 %_gel oral</u>	
Conservar en nevera. Proteger de la luz.	
Fecha elab:	Fecha cad:
Lote:	
Observaciones:	

Observaciones

Esta fórmula puede incluir un 2-3% de glicerina.

Bibliografía

Atienza M, Lluch A, Martínez J, Santos MD. Formulación en farmacia pediátrica. Litografía Sevillana. Sevilla, 2001.

Lidocaína gel oral

Indicaciones

- Anestesia tópica en mucositis y ulceraciones de la boca, faringe y esófago.

Posología

- 10 ml del gel para enjuagar y tragar, 3-4 veces al día.
 - 30 ml del gel para enjuagar y tirar, 3-4 veces al día.
- Intervalo mínimo de 3 horas entre toma y toma.
La dosis máxima de lidocaína es de 4,5 mg/kg/dosis

Información al paciente

No se debe masticar ni beber mientras tenga adormecida la boca después de utilizar la suspensión; esperar aproximadamente 20 minutos.

Emplear la dosis más baja posible con la que se consiga la anestesia adecuada, para evitar su absorción y la aparición de efectos adversos sistémicos.