

Sulfadiazina 100 mg/ml suspensión oral

Composición

Componentes	Cantidad
Sulfadiazina	10 g
Agua purificada c.s.p.	100 ml

Modo de elaboración

1. Triturar en un mortero la sulfadiazina hasta polvo fino.
2. Añadir suficiente cantidad de agua para humedecer el polvo.
3. Añadir agua hasta obtener la suspensión, pero reservando parte de la misma.
4. Transferir el contenido del mortero a una probeta graduada.
5. Utilizar el resto del agua para arrastrar el remanente del medicamento del mortero y vaciar en la probeta.
6. Comprobar que el volumen final es correcto (100 ml).
7. Agitar y transferir, sin dejar reposar la suspensión, a un envase topacio.

Caducidad y conservación

- Estabilidad: 7 días en nevera (2-8° C).
- Conservación: en nevera.

Etiquetado

Servicio de Farmacia	Hospital
<u>Sulfadiazina 100 mg/ml. suspensión oral</u>	
Conservar en nevera. Agitar antes de usar.	
Fecha elab:	Fecha cad:
Lote:	
Observaciones:	

Observaciones

En la bibliografía consultada para la elaboración de esta fórmula se utilizan comprimidos de sulfadiazina de 500 mg. Los autores indican que en lugar de agua purificada se puede utilizar jarabe simple. La conservación y período de estabilidad es igualmente de 7 días en nevera.

Bibliografía

- Frenkel JK. Toxoplasmosis. *Pediatr Clin North Am* 1985; 32: 917-932.

Sulfadiazina oral

Indicaciones

- Asociado a pirimetamina, está indicado en el tratamiento de la toxoplasmosis congénita.
- Tratamiento de infecciones urinarias, genitourinarias y nocardiosis.
- Profilaxis de fiebre reumática en pacientes alérgicos a penicilina.
- Tratamiento de malaria no complicada.
- Conjuntivitis, quemaduras, linfogranuloma venéreo, sinusitis, tracoma.
- Profilaxis de meningitis meningocócica.

Posología

- Toxoplasmosis congénita: 100 mg/kg/día dividido cada 12 horas, durante 12 meses, asociado a pirimetamina.
- Toxoplasmosis: 120-200 mg/kg/día dividido cada 6 horas, asociado a pirimetamina.
- Profilaxis de fiebre reumática:
 - Peso \leq 30 kg: 500 mg/24 horas.
 - Peso $>$ 30 kg: 1 g/24 horas.

Información al paciente

Se recomienda administrar con el estómago vacío, acompañado de agua. Se recomienda beber abundantes líquidos durante el tratamiento. Debe evitarse la exposición prolongada al sol. Debe observarse cualquier alteración cutánea (palidez, erupciones, dermatitis) ya que puede ser indicativo de reacciones adversas muy graves. El uso en niños menores de 2 años está contraindicado, excepto en el caso de toxoplasmosis congénita.