

Ursodesoxicólico ác. 20 mg/ml suspensión oral

Composición

Componentes	Cantidad
Ursodesoxicólico ác.	2 g
Ora Sweet-Ora Plus 1:1 c.s.p.	100 ml

Modo de elaboración

1. Triturar en un mortero el ácido ursodesoxicólico hasta polvo fino.
2. Elaborar la mezcla de excipientes Ora Sweet y Ora Plus en la proporción 1:1.
3. Añadir una pequeña cantidad de excipiente hasta formar una pasta uniforme.
4. Añadir el excipiente hasta obtener la suspensión, pero reservando parte del mismo.
5. Transferir el contenido del mortero a una probeta graduada.
6. Utilizar el resto del excipiente para arrastrar el remanente del medicamento del mortero y vaciar en la probeta.
7. Comprobar que el volumen final es correcto (100 ml).
8. Agitar y transferir, sin dejar reposar la suspensión, a un envase topacio.

Caducidad y conservación

- Estabilidad: 91 días en nevera (2-8 °C).
- Conservación: en nevera.

Etiquetado

Servicio de Farmacia	Hospital
<u>Ursodesoxicólico ác. 20 mg/ml, suspensión oral</u>	
Conservar en nevera.	
Agitar antes de usar.	
Fecha elab:	Fecha cad:
Lote:	
Observaciones:	

Observaciones

En la bibliografía consultada para la elaboración de esta fórmula se utilizan comprimidos de ácido ursodesoxicólico.

Bibliografía

Nahata M, Hipple T. Pediatric drug formulations, 4.^a ed. Harvey Whitney. Cincinnati, 2000.

Ursodesoxicólico ác. oral

Indicaciones

- Litiasis biliar.
- Cirrosis biliar primaria.
- En pacientes con atresia de vías biliares, para facilitar la excreción biliar.
- Colestasis crónica o secundaria a nutrición parenteral.
- En pacientes con fibrosis quística, para mejorar el metabolismo hepático de los ácidos grasos esenciales.

Posología

- Cirrosis biliar: 20 mg/kg/día.
- Atresia biliar: 10-15 mg/kg/día, en una única dosis.
- Pacientes con fibrosis quística, niños: 30 mg/kg/día.
- Colestasis crónica: 10-20 mg/kg/día.
- Colestasis secundaria a nutrición parenteral: lactantes y niños 30 mg/kg/día, dividido en tres dosis.

Información al paciente

Se recomienda administrar con las comidas. En caso de dosis diaria única, administrar al acostarse. Puede producir náuseas de forma persistente, vómitos y dolor abdominal.