

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo Español para el Desarrollo de la Farmacia Oncológica (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



CLORAMBUCILO suspensión oral (fórmula magistral)

Suspensión oral 2 mg/mL (Contiene jarabe simple y metilcelulosa)

Conservación: nevera (2-8°C), en su envase original y protegido de la luz

Caducidad: 7 días



POSOLOGIA

- Clorambucilo suspensión oral se administrará por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR Clorambucilo 2 mg/mL suspensión oral?

- Clorambucilo suspensión oral debe administrarse preferiblemente con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Evitar las comidas ácidas, picantes o especiadas.
- Agitar bien la suspensión antes de coger la dosis.

¿QUÉ hacer si.....?

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de media hora desde la toma.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología (Teléfono: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar CLORAMBUCILO?

- Si es alérgico al clorambucilo o a otros gentes alquilantes (consulte a su médico).
- Clorambucilo suspensión oral contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo Español para el Desarrollo de la Farmacia Oncológica (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

PRECAUCIONES

- Si padece crisis convulsivas o toma medicamentos que pudieran producirlas.
- Si ha padecido un traumatismo craneoencefálico.
- Usar con precaución en pacientes con mielosupresión.
- Evitar administrar vacunas vivas o consultar a su médico o farmacéutico antes de administrarlas.
- Si padece síndrome nefrótico.
- Si tiene enfermedad hepática.

INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de administrar la vacuna del rotavirus o vacunas vivas.
- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.
- Clorambucilo puede interactuar con comidas ácidas, calientes o especiadas.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Clorambucilo (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Rash cutáneo, prurito, edema
- Anemia, leucopenia, pancitopenia trombocitopenia, mielosupresión
- Hepatotoxicidad
- Dolor abdominal, diarrea, anorexia, náuseas y vómitos, estomatitis
- Mioclonías, neuropatía periférica, debilidad
- Convulsiones
- Ataxia, agitación, confusión, fatiga, fiebre, alucinaciones, irritabilidad, hiperactividad

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Erupción cutánea grave con formación de ampollas, descamación de la piel, fiebre
- Dificultad para respirar
- Dolor e inflamación de piernas., especialmente en la parte inferior y pantorrilla
- Fiebre alta > 38 °C, escalofríos (signos de infección)
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación

CONSERVACIÓN

- Almacenar en frigorífico (2-8°C), en su envase original y protegido de la luz.

CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Esta medicación deberá ser dispensada por los Servicios de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico especialista.

REFERENCIAS

- **Micromedex Healthcare® Series** [base de datos en Internet]. Greenwood Village,

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo Español para el Desarrollo de la Farmacia Oncológica (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

Colorado: Thomson MICROMEDEX DRUGDEX® System. 1974-2012.
Disponible en: <http://www.thomsonhc.com/home/dispatch> Drugdex ® de Thomson
Micromedex ® Healthcare Series.

- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. **Pediatric and Neonatal Dosage Handbook**. 18 th ed. American Pharmacists Association. Lexicomp.
- Diedra L. Bragalone. **Drug information Handbook for Oncology**, 9th ed. American Pharmacists Association. Lexicomp
- **BNF for Children**, 2012-2013

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Septiembre 2013/Enero 2014