

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



Hycamtin® 0,25 mg (topotecan)

Cápsulas duras de 0,25 mg

Caja con 10 cápsulas

Conservación: Conservar en nevera (entre 2° y 8°C). Mantenga las cápsulas en su envase original protegidas de la luz. No congelar.



POSOLOGIA

- Topotecan cápsulas se administrará por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR TOPOTECAN CÁPSULAS?

- Topotecan cápsulas puede tomarse con o sin alimentos
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.
- En caso de no poder tragar las cápsulas enteras, se recomienda utilizar la formulación líquida oral de topotecan (fórmula magistral).
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Si se requiere abrir la cápsula, debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

¿QUÉ hacer si.....?

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de media hora desde la toma.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología (Teléfono: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar TOPOTECAN CÁPSULAS?

- Si es alérgico a Topotecan, así como a alguno de los componentes de las cápsulas.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

PRECAUCIONES

- Si tiene enfermedad hepática o renal. Puede ser necesario ajustar su dosis.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción intestinal.
- Si piensa quedarse embarazada o piensa ser padre.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES

- Topotecán cápsulas puede interactuar con ciclosporina, ketonakol, ritonavir, saquinavir.
- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Topotecán (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Sensación de debilidad general y cansancio (anemia temporal).
- Moratones o sangrado no justificados al reducir el número de plaquetas. Tenga cuidado en realizar actividades de riesgo como manejar utensilios cortantes.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Náuseas y vómitos.
- Diarrea, estreñimiento y dolor de estómago.
- Inflamación y úlceras en la boca, lengua y encías.
- Pérdida de pelo.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Más de 3 episodios de diarrea en un día.
- Una reacción alérgica grave (Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel)
- Signos de infección (Tos, escalofríos, fiebre alta > 38 °C)
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

- Conservar en nevera (entre 2° y 8°C). No congelar.
- Mantenga las cápsulas en su envase original protegidas de la luz.

CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Esta medicación puede adquirirse en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico especialista.

REFERENCIAS

- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

productos sanitarios(AEMPS). Disponible en:

<https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm>

- Micromedex Healthcare® Series [base de datos en Internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson MICROMEDEX DRUGDEX® System. 1974-2012. Disponible en: <http://www.thomsonhc.com/home/dispatch> Drugdex ® de Thomson Micromedex ® Healthcare Series.
- Nahata MC, Pai VB, and Hipple TF. Pediatric Drug Formulations. 4th ed. Cincinnati, OH: Harvey Whitney Books Co: 2000
- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Catálogo de Medicamentos 2012. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. Pediatric and Neonatal Dosage Handbook. 18 th ed. American Pharmacists Association, editor. Hudson (OH): Lexi Com; 2010.

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Septiembre 2013/Febrero 2014

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)